

Cette intéressante espèce, qu'on ne peut confondre qu'avec certaines variétés du *C. moneta*, et qui s'en distingue, à première vue, par sa forme plus allongée et excavée en dessous, par la disposition de ses dents et de ses bourrelets, provient de la Nouvelle-Calédonie; nous la dédions à M. Barthélemy Lapommeraye, conservateur du musée de Marseille, qui nous l'a communiquée. B.

Description d'espèces nouvelles.

PAR MM. BERNARDI ET CROSSE.

1. *CONUS Lienardi* (Pl. 1, f. 2).

Testa elongato-turbinata, subcylindracea, intense nigro-spadicea, maculis albis aut cæruleo-albidis ornata numerosis, irregularibus, plerumque triangularibus; lævis, infra medium sulcis subdistantibus impressa; anfr. 10 obtuse carinatis, spira elata, subconcava, spiraliter rare-striata, albo et spadiceo variegata, apice rotundato; margine dextro acuto; intus carnea, fusco-limbata.

Long. 45, diam. max. 18 mill.

Habitat in Nova-Caledonia.

Coquille allongée, turbinée, subcylindrécée, lisse dans toute son étendue, à l'exception de la partie inférieure du dernier tour, qui est marquée de sillons assez éloignés les uns des autres. On compte dix tours de spire à carène peu sensible; la spire est élevée, légèrement concave, mêlée de blanc et de brun, et porte, dans le sens des tours, quelques stries peu apparentes; le sommet est arrondi, le bord droit tranchant. Le système général de coloration consiste en une multitude de taches blanches ou bleuâtres, de diverses formes et grandeurs, mais généralement triangulaires, sur un fond dont la nuance rappelle très-exacte-

ment celle du palissandre; l'ouverture est de couleur de chair à l'intérieur et bordée de brun dans l'échantillon représenté sur la planche; seulement ce dernier caractère n'est peut-être pas bien constant et nous paraît tenir, en grande partie, à l'état imparfaitement adulte de la coquille.

Cette espèce a 45 millimètres de longueur et en a 18 sur son plus grand diamètre; elle a été recueillie à la Nouvelle-Calédonie : nous la dédions à M. Liénard, de Maurice, dont on connaît le zèle pour les études conchyliologiques. (Coll. Liénard.)

Le *C. Lienardi* a la forme et la coloration générales des individus en bon état du *C. Mahogani* de Reeve; il s'en distingue par sa spire moins élevée, la légère concavité de ses tours, sa carène, son bord droit mince et tranchant, la disposition de ses sillons, qui ne présentent point de saillies, et les détails de son système de coloration, que nous avons décrit plus haut, et dans lequel on ne retrouve pas les traînées blanches longitudinales et les nombreuses lignes articulées transversales du *C. Mahogani*, qui, de plus, a l'ouverture blanche, et, à l'état adulte, le bord épais et pointillé de brun.

Notre espèce est encore assez voisine des *C. Bernardii* et *Gubba*, Kiéner, sous le rapport de la forme générale; elle en diffère par la plus grande élévation et la légère concavité des tours de spire, par la carène obtuse du dernier tour, arrondi dans les deux autres espèces, et enfin par le système de coloration.

2. TURBINELLA *Rollandi* (Pl. 1, f. 5).

Testa fusiformis, crassiuscula, subumbilicata, luteo-aurantiaca, apice mucronato, spiræ suturis subprofundis; anfr. 8 longitudinaliter costatis, transversim granulato-striatis; columella obscure

biplicata, pallide aurantiaca; fauce striata, pallide aurantiaca; cauda lata, breviuscula.

Long. 41, diam. max. 13 mill.

Habitat in Nova-Caledonia.

Coquille fusiforme, assez épaisse, légèrement ombiliquée, d'un jaune orangé clair; le sommet de la spire est pointu, la suture des tours assez profonde et flexueuse; on compte huit tours de spire ornés de côtes longitudinales assez nombreuses, et de stries transversales légèrement granuleuses; deux plis peu marqués à la columelle, qui est d'une nuance orangée plus intense que celle des tours de spire, quoique peu vive; l'ouverture est striée et de même couleur que la columelle; le canal est assez court et large. (Coll. Bernardi.)

Long., 41 mill. — Plus grand diam., 13 mill.



Cette Turbinelle, qui provient de la Nouvelle-Calédonie, se rapproche du *T. Caledonica*, Petit (1), pour la disposition des côtes et des stries et la coloration de l'ouverture; elle s'en distingue par une taille plus grande et des différences dans la forme et la coloration du canal. Elle paraît assez voisine du *T. spadicea*, Reeve (2), pour la dimension, l'aspect général et la forme du canal; mais elle a des stries plus serrées, des côtes plus nombreuses, moins saillantes, et une coloration différente.

Nous dédions cette espèce à M. Rolland du Roquan, de Carcassonne.

B. et C.

(1) *Journ. Conchyl.*, vol. 2, p. 367, Pl. 30, f. 6.

(2) *Conch. Icon.*, g. *Turbinella*, n° 44.



E. Levasseur, del et lith.

Lith. Pecquet frères.

- 1. Pecten Balloti, Bernardi.
- 2. Conus Lienardi, B. _____

- 3-4. Cyprea Barthelemyi, Bernardi.
- 5. Turbinella Rollandi, B. _____