

Description d'un *Céme* nouveau;

PAR M. BERNARDI.

Conus Duvivieri (Pl. XIII, t. 8.)

T. subelongato-turbinata, parva, solidâ, crassiuscula, ad basin leviter sulcata; spira elata, subacuta; anfr. 6. albo et brunneop coloris maculatis, ad suturam linea cinctis articulata; ultima confracuta spiram superante, pallide castaneo, maculis niveis albis variegato, linea alba brunneaque articulatis, numerosis, inegaliter distantiis, transversim cingulato; apertura fauce pallide violacea. — Long. 14, diam. max. 7 1/2 millim.

Habitat in insula Antillarum Guadeloupe dicta. (Coll. Crosse.)

Coquille de petite taille pour le genre, turbinée, légèrement allongée, solide, assez épaisse et marquée, vers la base, de quelques sillons peu prononcés. La spire est élevée, assez aiguë. Les tours, au nombre de six, sont maculés de blanc et de brun, et pourvus d'une ligne articulée peu sensible dans le voisinage de la suture; le dernier tour, plus grand que la spire, est d'une couleur marron un peu pâle, émaillée de taches d'un blanc vif et sillonnée transversalement par des lignes articulées de blanc et de brun, nombreuses et également distantes; l'intérieur de l'ouverture est d'un violet pâle. — Longueur, 14 millimètres; plus grand diamètre, 7 millimètres et demi.

Cette petite coquille semble représenter, du côté de

Fig. 3.



Fig. 8^a



Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 10.



E. Sowerby, del et Joh.

Fig. 1.




Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.




Fig. 9.



Fig. 10.



Fig. 11.



Joh. Brönn. Rom.

Fig. 1. *Batissa elegans*, Princ.

— 2. *Cyprina sphaerica*, P.

— 3. *Conus Duvali*, Bernardi.

— 4. *Glaucus Thomasi*, Crosse.

— 5. *Conus Danieli*, C.

Fig. 6. *Pirena Debeauxiana*, Crosse.

— 7. *Eulima subcyathiflata*, Dunker.

— 8. *Turritella umbilicata*, D.

— 9. *Turbonilla Weintraubii*, D.

— 10. *Rissoina granulosa*, Crosse.