



Ignatii a Born Eqv.

Academiae Imp. Naturæ Curiosorum, Petropolit.
Londinens. Holmens. Göttingens. Upsaliensis, Londin.
gothorum, Senens. Monacensis, Burghaus. Pata.
vinæ nec non Physicorum Berolinensium Sodalit.

INDEX
Rerum Naturalium
Musei
Cæsarei Vindobonensis
Pars I.^{ma}
Testacea

Verzeichniß
Der natürlichen Seltenheiten
des k. k.
Naturalien Cabinets
zu Wien
Erster Theil
Schalthiere

Vindobonæ, ex Officina Krausiana. 1778.



- Rumph. amb. t. 20. f. 1.*
Petiv. amb. t. 22. f. 4.
Gualt. Test. t. 19. f. E.
Swammerd. Bibl. nat. 1, 7. t. 7. 8. f.
Gev. Belust. 3. t. 8. f. a. b.
Knor. Vergn. I, 2, t. 6. f.
Mart. Konch. Kab. I. 20. t. 184. 185. f.
Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 19.

C. Conus.

C. Die Tutschnecke.

Linn. Syst. Nat. Gen. 319.

Testa conuoluta turbinata; apertura longitudinalis edentula; columella laevis.

Die zusammengerollte tutenförmige Schale hat eine nach der Länge herablaufende Mündung, ohne Zähne, und eine glatte Spindel.

C. I. Spira planiuscula.

C. I. Mit einem flachen Weibel.

C. I. I. Conus marmoreus.

C. I. I. Die Herztute.

Linn. S. N. Sp. 290.

Testa



Testa conica, maculis sub-
cordatis albis; spirae anfra-
ctibus canaliculatis.

Die kegelförmige Schale hat
herzförmige weiße flecken, und
rinnenförmig ausgefehlte Wir-
belgewinde.

α nigrescens, maculis aggregatis. α schwärzlich, mit nahe aneinander
stehenden flecken,

Belg. Hart-Toot. Rumph. Angl. Tiger-Shell Hill. Gall. Tigre
noir. Argenv.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 39.

Rumph. amb. t. 32. f. N.

Petiv. Gaz. t. 47. f. 11.

Valent. Abb. t. 3. f. 25. t. 7. f. 65. A.

Gualt. Test. t. 22. f. D.

Seb. Thes. III. t. 46. f. 1 — 4. 13 — 19.

— — — t. 47. f. 1. t. 55. f. 23.

Adans. Seneg. Pl. 6. f. 1.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Regensf. Samml. I. 5. t. 53. f.

Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 685. f.

β testa rufa, maculis aggregatis. β rothbraun, mit nahe aneinander
stehenden flecken.

Belg. Root-Hart-Toot. Gall. Leopard rouge. Argenv.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 123.

Rumph. amb. t. 32. f. 1.

Valent.



Valent. Abb. t. 5. f. 43.

Seb. Thes. III. t. 42. f. 2. 4.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. 0.

Knor. Vergn. I. 15. t. 2. f.

— — — *IV. 17. I. f.*

Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 686. f.

Testa nigra, maculis rarioribus. γ schwarz, mit etwas zerstreuten Flecken.

Belg. Schout by Nagt. Gall. Contre Ammiral

Valent. Abb. t. 2. f. 10. t. 5. f. 44.

Seb. Thes. III. t. 46. f. 5 — 12. t. 47. f. 5. 6.

Knor. Vergn. I. 7. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 687. 688. f.

C. I. 2. Conus imperialis.

C. I. 2. Die Krontute.

Linn. S. N. Sp. 291.

Belg. Kroon - Horn. Rumph. Angl. Crown - Stamper. Petiv. Gall. Couronne imperiale *Argenv.*

Testa conica alba, fasciis ochraceis, lineisque articulationis transversis.

Die kegelförmige weiße Schale hat ochergelbe Bänder, und linienförmige unterbrochene Quergürteln.

Spi-



Spiras anfractus coronati.

Die Wirbelgewinde sind mit Knoten gekrönt.

Rumph. amb. t. 34. f. H.

Petiv. amb. t. 7. f. 6.

Gualt. Test. t. 22. f. A.

Seb. Thes. III. t. 47. f. 18 — 20.

Argenv. Conch. Pl. II. f. F.

Knor. Vergn. II. II. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 690. 691. f.

C. I. 3. *Conus fusca-*
tus.

C. I. 3. Die schwarze
braune Krantute.

Belg. Tueete Kron-hoorn. Angl. Blaauw's Stamper. Pet.

Testa alba fusco maculata,
lineis transuersis obscurioribus
interruptis.

Die weiße und braungefleckte Schale hat linienförmige unterbrochene schwarzbraune Gürteln.

Rumph. amb. t. 34. f. J.

Petiv. amb. t. 15. f. 17.

Klein Meth. Ostr. t. 4. f. 84.

Seb. Thes. III. t. 3. f. 35.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. E.

Regenf. Samml. I. 3. t. 35. f.

Mart. Konch. Kab. II. 62, t. 692. 693. f.



Testa obuerse conica fusca, maculis longitudinalibus confluentibus albis. Cingula tenuia transversa, atrofusca, interdum albo articulata. Spiraplaniuscula. Anfractus dentibus coronati. Mucro centralis promiaulus.

Die Schale ist verkehrt kegelförmig, von brauner Farbe. Nach ihrer Länge herablauteu zusammensießende weißse Riecken. Die linienförmigen schwarzbrannen Gürteln sind manchmal weiß gegliedert. Der Wirbel ist etwas flach. Die Gewinde sind mit knottigen Kronen besetzt. Die Wirbelspitze ragt in der Mitte hervor.

C. I. 4. Conus litteratus.

C. I. 4. Die Tigertute.

Linn. S. N. Sp. 292.

Belg. Letter-Hoorn. Rumph. Angl. Horn - Book - stamper. Pet. Gall. Danier. Dav.

Testa conica alba, maculis quadratis, seriatim digressis.

Die kegelförmige weiße Schale ist mit würflichten Flecken reiheweise besetzt.

Bonan. Recr. et. 3. f. 363.

List. Hist. Conch. t. 4. 5. 10. p. 2. f. 20.

Rumph. amb. t. 31. f. D.

Petiv. Gaz. t. 41. f. D.

— amb. t. 2. f. 5.

Gualt. Test. t. 21. f. O.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. I.



Seb. Tbes. III. t. 45. f. I. — 5.

Regenf. I. 3. t. 29. f.

Knor. Vergn. I. 16. t. 3. f.

— — — III. 3. t. 2. f.

— — — IV. 26. t. I. f.

— — — *'Delic nat. I. t. B. III. 4. f.*

Mart. Konch. Kab. II. 60. t. 666 — 669. f.

Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 9.

α punctis fuscis subaequalibus; absque fascia transuersa. α mit beinahe gleichgroßen braunen Punkten, ohne Quersband.

β punctis fuscis subaequalibus, absque fascia transuersa, spira nodoso coronata. β mit beinahe gleichgroßen braunen Punkten ohne Quersband, und gekrümmter Wirbelspitze,

γ punctis fuscis confertis, fascia gemina flaua. γ mit gedrängt stehenden braunen Punkten und gedoppelten gelben Bänder.

δ punctis fuscis distinctis. fasciis tribus flavescentibus. δ mit zerstreuten braunen Punkten, und drey gelblichen Bändern.

ε maculis quadratis fuscis, fasciisque tribus transuersis latis. ε mit würflichten braunen Flecken, und drey breiten Quersbändern.

ζ maculis punctisque confluentibus fuluis. ζ mit zusammenfließenden rotgelben Flecken, und Punkten.



C. I. 5. *Conus generalis.* C. I. 5. Das Klöppel-
füssen.

Linn. S. N. Sp. 293.

Belg. Speeldewerk Kuffen. *Rumph.* *Angl.* Net - listed - Stamper
Petiv. Gall, La Flamboyante *Argenv.*

Testa conica ferruginea, fa-
s-ciis tribus interruptis albis,
antractibus canaliculatis,

Die kegelförmige rostfärz-
bige Schale hat drey weiße un-
terbrochene Bänder, und aus-
gekehlte Wirbelgewinde.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 34.

Petiv. Gaz. l. t. 27. f. 11.

— *amb. t. 3. f. 9.*

Rumph. amb. t. 33. f. Y.

Gualt. Test. t. 20. f. G.

Seb. Thes. III. t. 54. f. 11 — 13.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. T.

Regenf. Samml. l. 6. t. 65. f.

Knor. Vergn. III. 17. t. 4, 5. f. 18. t. 3, 4. f.

Mart. Konch. Kab. II. 58. t. 648 — 652. f.

Da Cost. Elem. Pl. 5. F. 8.

α fasciis fuscis.

α mit braunen Bändern.

β fasciis fulvis.

β mit rothgelben Bändern.



C. I. 6. *Conus candidus*.

C. I. 6. Die weiße Krone-
tute.

Testa conica glabra alba,
spirae anfractibus coronatis.

Die Kegelförmige glatte weiße
Schale hat gekrönte Wirbel-
gewinde.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica solida niuea; Ven-
ter conuexiusculus; Apex centra-
lis prominulus, decorticatus, ame-
thylinus.

Die Kegelförmige dicke Schale
ist weiß, einigermassen bläulich Die
abgenützte in der Mitte hervor-
ragende Wirbelspitze ist amethystfarbig.

C. I. 7. *Conus Virgo*.

C. I. 7. Die Mennoni-
tentute.

Linn. S. N. Sp. 294.

Belg. Mennonist *Toot.* *Rumph.* *Angl.* Wax - stamper. *Petiv.* *Gall.*
Bout de Chandelle. *Dav.*

Testa conica pallida, trans-
uersim rugoso striata, basi
violacea.

Die Kegelförmige weißliche,
der Quere nach runzelicht ge-
streifte Schale hat eine violette
Grundspitze.

List. Hist. Conch. l. 4 s. 10. p. 2. f. 3.

Rumph. *amb.* t. 31. f. E.

Petiv. *amb.* t. 8. f. 9.

Gualt. *Test.* t. 20. f. B.

Seb.



Seb. Tbes. III. t. 47. f. 8, 9.

Knor. Vergn. III. 22. t. I. f.

Mart. Konch. Konch II. 53. t. 585. f.

C. I. 8. *Conus tessulatus*. C. I. 8. Der Estrich.

Belg. Italienische Vloerken. Angl. The italien Parment. Gall. Nappo d'Italie.

Testa conica alba, maculis oblongis cinnabarinis; basi sulcata, amethystina.

Die kegelförmige weiße Schale hat langwürfliche zinnrothe Flecken und eine gefurchte amethystfarbige Grundfarbe,

List. Hist. Conch. I. 4. s. 10. p. 2. f. 17.

Valent. Abb. 6. t. 52. f.

Quatt. Test. t. 21. f. H.

Seb. Tbes. III. t. 55. f. 4 — 9.

Regenf. Sammi. I. 8. t. 19. f.

Knor. Vergn. II. 12. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 653. f.

An praecedentis varietas ?

Vielleicht eine Abänderung der vorhergehenden Art.

C. I. 9. *Conus Capita-neus*. C. I. 9. Die Käsetute.

Linn. S. N. Sp. 295.

I 2

Belg.



Belg. Groene Kaas Rumph. Angl. Green Stamper. Pet. Gall. L'Her-
mine Dav.

Testa conica glabra, fasciis Die kegelförmige g'atte
duabus albis fusco maculatis. Schale hat zwey braun gefleck-
te Querbänder.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 27.

Rumph. amb. t. 33. f. X.

Petiv. amb. t. 9. f. II.

Gualt. Test. t. 22. f. M.

Seb. Tbes. III. t. 22. f. 26, 27, 30, 31, 33.

Argenc. Conch. Pl. 12. f. K.

Regensf. Samml. I. 7. t. 7. f.

Knor. Verg. I. 15. t. 3. f.

—— ——— V. 16. t. 2. f.

Mart. Conch. Kab. II. 59. t. 660-662. f.

α oliuacea.

α olivengrün.

β fusca.

β rothbraun.

C. I. 10. Conus miles. C. I. 10. Die Zwirnz-
tute.

Linn. S. N. Sp. 296.

Belg. Arakans - Garen. Rumph. Angl. Garter Stamper. Petiv. Gall.
Le Noët. Argenc.

Testa conica albida, fasciis Die kegelförmige weiße
duabus transuersis fuscis. Schale hat zwey braune Quers-
bänder.

List



List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p 2. f. 34.

Rumph. amb. t. 33. f. W.

Petiv. amb. t. 8. f. 1.

Gualt. Test. t. 20. f. N.

Seb. Thes. III. t. 42. f. 23, 25.

Argemv. Conch. Pl. 12. f. L.

Knor. Vergn. I. 15. t. 4. f.

— — — III. I. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 663. 664. f.

C. I. II. Conus Centurio,

C. I. II. Der Drangengegel.

Testa conica, basi attenuata transuersim sulcata, anfractibus canaliculatis.

Die Kegelförmige Schale ist au dem zugespizten Grunde in die Quere gefurchet, und an den Gewinden ausgekehlet.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica, laeuis; Basis attenuata, sulcis transuersis. Spira planiuscula. Anfractus contigui, canaliculati. Vertex obtusius centralis. Color aurantius. Fasciae duae transuersae albae, lineis aurantius angulatis oblique transcurrentibus.

Die Schale ist kegelförmig und glatt. Der Grund zugespizt, und in die Quere gefurchet. Der Schnirkel flach. Die Gewinde berühren einander, und sind rinnenförmig ausgekehlet. Der stumpfe Wirbel stehet in der Mitte. Die Farbe ist orangengelb. Zwei breite Querbänder sind mit schiefen orangensfarbigen eckigen Linien durchzogen.



C. II. Spira pyramidata.

C. II. Mit einem pyramidenförmigen Wirbel.

C. II. 1. Conus Princeps.

C. II. 1. Die Bastardbauernmusik.

Linn. S. N. Sp. 297.

Belg. Bastert Tygers Katje. Gall. La fausse Hebraïque. Dav.

Testa turbinata fusco nigra, Die spizwirblice Schale ist lineis longitudinalibus, fle- braunschwarz, und mit blassen xuois, pallidis. gekrümmten Strichen nach der Länge herab besetzt.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 26.

Valent. Abh. II. t. 94. f.

Gualt. Test. t. 25. f. Q.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. B.

Seb. Thes. III. t. 47. f. 30, 31.

Knor. Vergn. III. 4. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 63. t. 699. 700. f.

C. II. 2. Conus Ammiralis.

C. II. 2. Die Admiraltute.

Linn. S. N. Sp. 298.

Belg. Opper-Admiral. Angl. Burg's-stamper. Petiv. Gall. Le grand Admiral. Argenv.

Testa



Testa fulva, maculis disper-
sis albis, fasciisque transuer-
sis reticulatis.

Die rothbraune Schale ist
mit zerstreuten Flecken besetzt,
und mit nezförmigen Querbän-
dern umgeben.

α fasciis transuerfis tribus, se-
cunda cingulo articulado bifariam
diuisa.

α mit drey Querbändern, davon
das zweyte durch einen gegliederten
Gürtel abgetheilet ist.

Rumph. amb. t. 34. f. B.

Petiv. amb. t. 14. f. 18.

Argenv. Conch Pl. 12. f. N.

Adans. Seneg. Pl. 6. f. 4.

Seb. Thes. III. t. 48. f. 5, 6.

Knor. Vergn. I. 8. t. 2. f.

— Delic. nat. I. t. B. V. f. 6.

β fasciis quatuor, secunda obso-
leta tenui, tertia cingulo articula-
to bifariam diuisa.

β mit vier Bändern, davon das
zweyte unvollkommen und schmal,
das dritte durch einen gegliederten
Gürtel abgetheilet wird.

γ fasciis quatuor, secunda obso-
leta tenui, tertia lata, cingulis
articulatis duobus trifariam partita.

γ mit vier Bändern, davon das
zweyte unvollkommen und schmal
ist, das dritte breite aber durch
zwey gegliederte Gürteln dreymal
abgetheilet wird.

Petiv. amb. t. 15. f. II.

Argenv. Suppl. Pl. I. f. P.

Seb. Thes. III. t. 48. f. 4. 6.

Mus. Caes. Vindobon.



C. II. 3. *Conus Sena-*
tor,

C. II. 3. Die Schild-
krötentute.

Linn. S. N. Sp. 300?

Belg. Schildpad - Toot. *Gall. Ecaile de tortue,*

Testa ovata nebulosa laevi, Die eiförmige nebelichte
transversim articulato striata. glatte Schale ist mit unterbro-
chenen Querstreifen umgeben.

Seb. Thes. III. t. 43. f. 29, 36.

Knor. Vergn. VI. I. t. 5. f.

Mart. Conch. Kab. II. 55. t. 609 — 611. f.

C. II. 4. *Conus genuanus.*

C. II. 4. Die guineische
Tute.

Linn. S. N. Sp. 302.

Belg. Geneefche Toot. *Gall. Aile de papillon. Argemv.*

Testa pallido rubra, cingu- Die blaßrothe Schale ist
lis albo fuscoque articulatis. mit weiß und braun unterbro-
chenen Bändern umgeben.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 337.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 16.

Rumph. amb. t. 34. f. G.

Argemv.



Argenv. Conch. Pl. 12. f. V.

Seb. Thes. III. t. 48. f. 1 — 3.

Knor. Vergn. III. 1. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 623 — 625.

C. II. 5. Conus Mo- C. II. 5. Der Mönch,
nachus.

Linn. S. N. Sp. 304.

Belg. Graeuve Munniker. Rumph. Angl. Gray Monk. Petiv.

Testa laevi fusca, albo & Die glatte braune, weiß
coerulefente nebulata, basi und hellblau wolkigte Schale
transuerse sulcata. hat eine in die Quere gesurchte
Grundspitze.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 126.

Rumph. amb. t. 33. f. CC.

Petiv. amb. t. 15. f. 7.

Valent. Abb. 9. t. 74. f.

Seb. Thes. III. t. 48. f. 45.

Regenf. Samml. I. 12. t. 68. f.

Knor. Vergn. III. 16. t. 2. f.

— — — V. 18. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. II. 55. t. 614. f.



C. II. 6. Conus mini-
mus.

C. II. 6. Der graue
Mönch.

Linn. S. N. Sp. 305.

Gall. La minime, Dav.

Testa ovato oblonga, glau-
co albidoque nebulosa, lineis
fuscis interruptis cineta.

Die ensförmige längliche blau-
licht graue Schale hat weisse
Wolken und braune unterbro-
chene Querstreife.

Variat etiam spira coronata.

Es giebt auch eine Abänderung
mit gekröntem Wirbel.

Valent. Abb. 3. t. 24. f.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. A.

Knor. Vergn. III, 27. t. 2. f.

C. II. 7. Conus Mer-
cator.

C. II. 7. Die bandirte
Netzute.

Linn. S. N. Sp. 307.

Belg. Net - Tootje.

Testa ovata alba, fasciis
latis reticulatis fulvis.

Die ensförmige weisse Schale
hat breite ensförmige roth-
gelbe Bänder.

List. Hist. Conch. J. 4. s. 10. p. 2. f. 41.

Valent. Abb. 7. t. 65. B. f.

Argenv.



Argenv. Conch. Pl. 12. f. P.

Adans. Seneg. t. 6. f. 3.

Knor. Vergn. II. 1. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 620. f.

C. II. 8. *Conus reticulatus.*

C. II. 8. Das Fischer-
netz.

Gall. Drap à réseau.

Testa ovato oblonga niuea,
undique fuluo reticulata.

Die eiförmige längliche
weiße Schale ist allenthalben
mit einem rothbraunen Netze
überzogen.

Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 621. f.

Testa ovata, pyriformis, gla-
berrima niuea, filis reticulatis ful-
uis intertexta, areolis lanceolatis,
transuerfis. Basis attenuata trans-
uersim fulcata. Spira pyramidata
laeuis, anfractibus contiguus. Ver-
tex centralis acuminatus.

Die eiförmige birnförmige Schale
ist glatt, schneeweiß, mit roth-
braunen netzförmigen Fäden beina-
het, deren Zwischenflächen länglich,
und in die Quere gestellet sind.
Der Schnirkel ist pyramidenförmig
und glatt, die Gewinde aneinander
verwachsen. Der Wirbel raget aus
der Mitte spizig hervor.

An prioris Varietas?

Etwan eine Abänderung der vo-
rigen Art?

C. II. 9. *Conus berulius.*

C. II. 9. Die gelbe But-
terwecke.

Linn.



Linn. S. N. Sp. 308.

Belg. Boterweg. Rumph. Angl. Great yellow Leopard Stamper.
Pet. Gall. Pelote de beurre, Dav.

Testa turbinata laeui, maculis fuscis per series cincta, basi rugosa.

Die spizwirblige glatte Schale ist mit braunen Flecken reiheweise umgeben, und an der Grundspitze runzelicht.

List. Hist. Conch. 1. 4. s. 10. p. 2. f. 11.

Rumph. amb. t. 31. f. C.

Petiv. amb. t. 15. f. 2.

Gualt. Test. t. 21. f. B.

Seb. Thes. III. t. 44. f. 1 — 4.

Knor. Vergn. II. 11. t. 3. f.

DaCost. Elem. Pl. 5. f. 3.

Mart. Konch. Kab. II. 60 t. 665. f.

C. II. 10. Conus figurinus.

C. II. 10. Die Eichenholzstute.

Linn. S. N. Sp. 309.

Belg. Eckenhouts - Toot. Rumph. Angl. The Oacken - wood stamper.
Gall. Le bois de Chene.

Testa turbinata laeui, lineis transuersis fuscescentibus.

Die spizwirblige glatte Schale ist mit braunlichen Quersstrichen umgeben.



List. Hist. Conch. t. 4. s. 10. p. 2. f. 28.

Rumph. amb. t. 31. f. V.

Gualt. Test. t. 20. f. E.

Argens. Conch. Pl. 12. f. A.

Regensf. Samml. I. 10. t. 47. f.

Knor. Vergn. III. I. t. 23. f.

— — *V. 25. t. 2. f.*

Mart. Conch. Kab. II. 59. t. 656, 657. f.

C. II. 11. Conus ermi-
neus.

C. II. 11. Der Her-
melinschwanz.

Belz. Hermelin Staart. Gall. Queue d'Hermine. Dav.

Testa pyriformi fulva basi
striis punctatis scabra, fasciis
transuersis niueis.

Die birnsförmige rothgelbe
Schale hat am Grunde erha-
bene punktirte Streife, und
schneeweiße Querbänder.

Valent. Abb. 5. t. 47. f.

Gualt. Test. t. 20. f. Q.

Seb. Tbes. III. t. 42. f. 31 — 40.

Mart. Kouch. Kab. II. 57. t. 631. f.

Testa pyriformis glabra, basi trans-
uersim striata, striis elevatis pun-
ctatofcabis. Spira conica. Anfra-
ctus glabri planiusculi. Color ful-
vus, spira albo maculata; ventris

Die Schale ist birnsförmig, und
glatt, am Grunde in die Quere
gestreift, und auf den erhabenen
Streifen mit Röhren besetzt. Der
Schnirkel ist kegelförmig. Die

cin-



cingula duo interrupta alba. Puncta eleuata alba.

Gewinde glatt und etwas flach. Die Farbe rothgelb an dem Schnitzel weißgefleckt, und um den Leib mit zweyen unterbrochenen Querbändern umgeben. Die erhabenen Punkte, oder Körner sind weiß.

C. II. 12. Conus Hebraeus.

C. II. 12. Die Bauernmusik.

Linn. S. N. Sp. 310.

Belg. Böeren - myfky. Rumph. Angl. Black Diamond Stamper
Pet. L'Hebraique. Dav.

Testa ouata, maculis oblongis per series transuersim cincta.

Die eysförmige Schale ist mit länglichen Flecken der Quere nach reiheweise umgeben.

α maculis fuscis

α mit braunen Flecken.

β maculis rufis.

β mit rothgelben Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 122.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 25.

Rumph. amb. t. 33. f. BB.

Petiv. amb. t. 9. f. 12.

— Gaz. t. 99. f. 12.

Gualt. Test. t. 2. f. 1.

Argens. Conch. Pl. 12. f. G.

Adans. Seneg. t. 6. f. 5.

Seb.



Seb. Thes. III. t. 47. f. 28 — 29.

Knor. Vergn. III. 6. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 617. f.

C. II. 13. *Conus Stercus muscarum.* C. II. 13. *Die Sandtute.*

Linn. S. N. Sp. 311.

Belg. Vliegge - Schettje. Rumph. Angl. Sand - Stamper. Pet. Gall. Piquere de mouche.

Testa oblonga punctis pictis adspersa; anfractibus canaliculatis. Die längliche Schale ist mit gefärbten Punkten bestreuet, und an den Gewinden ausgekehlet.

* *elongata. spirae anfractibus aequalibus.* α länglich, mit glatten Wrebelgewinden.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 9.

Petiv. Gaz. t. 75. f. 1.

— *amb. t. 15. f. 21.*

Rumph. amb. t. 33. f. Z.

Gualt. Test. t. 25. f. N. O.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. E.

Seb. Thes. III. t. 55. f. 1.

Regenf. Samml. I. 7. t. 2. f.

Knor. Vergn. I. 7. t. 5. f.

— *Del. nat. I. t. B. 5. f. 7.*

Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 711 — 713. f.

β ventri-



β *ventricosa*, spirae anfractibus coronatis. β bäuchig, mit gekrönten Windgewinden.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 2. f. 10

Argenv. Conch. Pl. 12. f. S.

Mus. Caes. Vindobon.

C. II. 14. *Conus varius.*

C. II. 14. Die Löwenturte.

Linn. S. N. Sp. 312.

Belg. Westindische Landcharten. Gall. Peau de chagria. *Argenv.*

Testa elongata, punctis elevatis cincta, spirae anfractibus coronatis.

Die längliche Schale ist mit erhabenen Punkten umgeben, und an den Winden gekrönt.

α fusca, maculis confluentibus ramosis. α braun, mit weißen zusammenfließenden Flecken.

β lutea, maculis albis dispersis solitariis. β gelb mit weißen zerstreuten einzelnen Flecken.

Gualt. Test. t. 20. f. T.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. R.

Seb. Thes. III. t. 44. f. 20 — 21.

Knor. Vergn. I. 24. t. 5. f.

— — II. I. t. 5. f.

— — VI. I. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 6. I. t. 578. 679. f.



C. III. Elongati.

C. III. Lange Lutem.

C. III. 1. Conus Nuffa-
tella.C. III. 1. Der punktir-
te Bohrer.*Linn. S. N. Sp. 314.**Belg. Gegrannuleerde Kuipers - Boor. Rumph. Angl. Grain girdled
Stamper. Petiv. Gall. Tarrriere chagrinee.*Testa subcylindrica, striis
transuersis eleuatis punctato
maculatis.Die fast walzenförmige
Schale ist der Quere nach mit
erhabenen Streifen umgeben,
und mit gefleckten Punkten be-
setzt.*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 1. f. 35.**Rumph. amb. t. 33. f. EE.**Petiv. amb. t. 15. f. 13.**Gualt. Test. t. 25. f. L.**Argenv. Conch. Pl. 13. f. P.**Knor. Vergn. II. 4. t. 7. f.**— — — III. 19. t. 4. f.**Mart. Conch. Kab. II. 51. t. 567. f.*C. III. 2. Conus Tere-
bra.C. III. 2. Der Zirkelboh-
rer.*Belg. Witte gevoornde Kuypers - Boor. Gall. Tarrriere blanche &
noelée.*

K

Testa



Testa oblonga albida, striis Die längliche weiße Schale
 elevatis transversis parallelis. ist mit erhabenen parallelen
 Querstreifen umgeben.

Mart. Konch. Kab. II. 52. t. 577. f.

Testa oblonga crassa, transver-
 sim striata; striis elevatis paral-
 lis. Spira conica; anfractus decli-
 ves, striati, contigui. Color ru-
 bellus, fasciis duabus transversis
 obsoletis albis. Vertex, & basis
 spoliata, amethystina.

Die Schale ist länglich, und dicht
 in die Quere gestreift. Die Strei-
 fen erhaben, und gleichweit von
 einander entfernt. Der Wirbel
 kegelförmig, die Gewinde ab-
 hängig, gestreift, und aneinander
 gewachsen. Die Farbe blaugroth mit
 zweyen matten weißen Querbän-
 dern, der Wirbel, und die Grundfläche
 haben, wenn sie abgezogen sind,
 eine Amethystfarbe.

C. III. 3. Conus gra-
 nulatus.

C. III. 3. Der gefurch-
 te Bohrer.

Linn. Syst. Nat. Gen. 315.

*Belg. Bastert Orangie Admiraal. Angl. Small chain Stamper. Petiv.
 Gall. Faux Amiral orangé.*

Testa oblonga transversim
 fulcata, fasciis albis fusco
 maculatis.

Die längliche in die Quere
 gefurchte Schale ist mit weiß-
 sen braungestreckten Querbän-
 dern umgeben.

Rumph. amb. t. 32. f. T.

Petiv. amb. t. 15. f. I.

Gualt.



Gualt. Test. t. 25. f. H.

Seb. Tbes. III. t. 48. f. 26.

Knor. Vergn. III. 6. t. 5. f.

— — *V. 24. t. 2. f.*

C. III. 4. Conus circum-
cisus.

C. III. 4. Der Oranien-
bohrer.

Testa subcylindrica fusco-
que maculata, striis incisus
transuersis.

Die fast walzenförmige
Schale ist braungefleckt, und
mit eingeschnittenen Querstri-
chen umgeben.

Valent. Abb. t. 2. f. II.

Mart. Koncb. Kab. II. 52. t. 571. f.

Testa subcylindrica laevis striis
transuersis incisus parallelis. Spira
planiuscula. Vertex prominens, acu-
tus centralis. Color ex flavescenti
rubescens, fasciis transuersis obso-
letis albis, punctis dispersis rubris.

Die walzenförmige Schale ist
in die Quere mit eingeschnittenen,
parallelen Strichen umgeben. Der
Schnirbel ist flach. Der spitzige
Wirbel ragt aus der Mitte hervor.
Die Farbe ist gelblich roth, mit
matten weißen Querbändern, und
zerstreuten rothen Punkten.

C. III. 5. Conus planor-
bis.

C. III. 5. Der Platte-
wirbel.



Testa conico ventricosa ful-
ua, basi transversim striato
punctata; spira plana canali-
culata.

Die kegelförmige rothgelbe
Schale ist am Grunde mit
punktirten Streifen umgeben,
und auf dem flachen Schnirtel
ausgekehlet.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica ventricosuscula,
prope basin transversim striata, striis
elevatis, punctato scabris. Spira
plana. Anfractus canaliulati, mar-
gine extimo acuto. Color ventris
fulvus, spira alba fulvoque ma-
culatus. Basis intus amethystina.

Die kegelförmige etwas bäuchige
Schale ist am Grunde in die Quere
gestreift, die Streifen erhaben,
und mit Abtrümmern besetzt. Der Schnir-
tel flach. Die Gewinde ausgekehlet,
am äußersten Rande scharf. Die
Schale ist rothgelb, der Schnirtel
weiß gestreift. Der Grund inwän-
dig amethystfärbig.

C. III. 6. Conus Magus.

C. III. 6. Das gefleck-
te Käzchen.

Linn. S. N. Sp. 317.

Belg. Geplekte Katje. *Rumph.* *Angl.* Tabby Stamper. *Petiv.* Gall.
lat. Picotée. *Argenv.*

Testa subcylindrica, fasciis
longitudinalibus albo puncta-
tis.

Die fast walzenförmige
Schale hat nach der Länge
laufende punktirte Bänder.

Rumph. amb. t. 32. f. Q.

Petiv. amb. t. 5. f. 10.

Argenv. Suppl. Pl. 2. f. C?

Gualt.



Gualt. Test. t. 20. f. F.

Seb. Thes. III. t. 44. f. 27.

Knor. Vergn. VI. 16. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. II. 58. t. 64I. f.

C. III. 7. *Conus striatus.* C. II. 7. *Die Wolfenrolle.*

Linn. S. N. Sp. 318.

Belg. De Wol'khoorn. Rumph. Angl. Tyger Stamper. Petiv. Gall. l'Ecorchée. Argenv.

Testa ouato oblonga nebulosa, lineis parallelis transversim picta. Die eysförmig längliche wollichte Schale ist mit gleichweit entfernten Linien bemalt.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 6.

Valent. Abb. 7. t. 60. 61. f.

Rumph. amb. t. 31. f. F.

Petiv. amb. t. 15. f. 4.

— *Gaz. t. 98. f. 9.*

Gualt. Test. t. 26. f. D.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. C.

Seb. Thes. III. t. 42. f. 5, 10.

Regenf. Samml. I. 8. t. 13. f.



Knor. Vergn. I. 18. t. 1. f.

— — — *III.* 12. t. 5. f. 21. t. 1. f.

Mart. Conch. Kab. II, 64. t. 714 — 716. f.

C. III. 8. Conus Textile.

C. III. 8. Die Spitzenrolle.

Linn. S. N. Sp. 319.

Belg. Gouldlaken. *Rumph. Angl.* Goldbrocade *Scheil.* *Holl. Gall.*
Le Drap d'or. *Dav.*

Testa ovato oblonga, venis reticulatis fuscis, maculis luteis fuscisque.

Die eiförmige, längliche gelb, und braun gefleckte Schale ist mit netzförmigen braunen Adern bemalet.

Bouan. Recr. cl. 3. f. 135.

List. Hist. Conch. I, 4. f. 10. p. 2. f. 43.

Rumph. amb. t. 32. f. O. P.

Petiv. amb. t. 15. f. 9.

Gualt. Test. t. 25. f. X.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. F. I.

Adans. Seneg. Pl. 6. f. 7.

Seb. Tbes. III. t. 43. f. 6 — 12. t. 47. f. 13 — 17.

Regenf. Samml. I. 6. t. 62. f.

Knor. Vergn. I. 18. t. 6. f.

— — — *II.* 8. t. 3. f.

Mart.



Mart. Konch. Kab. II. 54. t. 598 — 600.

C. III. 9. *Conus auli-* C. III. 9. Die Brunette.

ous.

Linn. S. N. Sp. 320.

Belg. Bruinet - Toot Rumph. Angl. The Porphyry Shell. Hill. Gall. La Brunette. Dav.

Testa subcylindrica, maculis Die beinahe walzenförmige
dispersis inaequalibus trigonis. Schale ist mit zerstreuten un-
gleichen dreyeckigen Flecken be-
zeichnet.

Bonze Rec. cl. 3. f. 133.

Rumph. amo. 3. f. 3.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. G.

Seb. Thes. t. 43. f. 1, 2, 4, 5; t. 47 f. 13 — 15.

Regenf. Samml. I. 8. t. 25. f.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. II. 5. t. 3. f.

—— — III. 19. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II. 53. t. 592. f.

C. III. 10. *Conus pen-* C. III. 10. Die Feder-
naceus. tute.



Belg. De Zilver Lakén Rumph. Gall. Volute pannachée.

Testa conica cinnamomea, Die kegelförmige zimmetfar-
lineis punctatis transuerlis, & bige Schale ist mit punktirten
maculis pennatis dispersis pal- Querlinien, und zerstreuten
lidis picta. weißlichen federförmigen Fle-
cken bemalt.

Mart. Konch. Kab. II. 54. t. 596. f.

Mus. Caes.-Vindobon.

Testa conica crassa glaberrima. Die Schale ist kegelförmig, dicht
Spira obtusa anfractibus infimis pla- und glatt, der Schnirkel stumpf,
nis, supremis eleuatis in ver- die unteren Gewinde flach, die obe-
ticem centrale pyramidatum ob- ren in der Mitte pyramidenförmig
tusum. Color cinnamomeus. Li- erhaben, und zugespitzt, zinno-
neae pictae transuersae ex seriebus berfärbig mit rothbraunen aus
punctorum ruforum. Maculae di- Punkten zusammengesetzten Quer-
persae, albiae, aut pallide vio- linien. Die zerstreuten weißen, oder
laceae, pennatae. weißblauen Flecken, sind federförmig.

C. IV. Laxi, ventricosi.

C. IV. Weltbäuchige Tuten.

C. IV. I. Conus Spe-
ctrum.

C. IV. I. Das Gespenst.

Linn. S. N. Sp. 321.

Belg. Spookje. Rumph. Angl. Fairy-Stamper Petiv. Gall. Le Spectre.

Testa oblonga gibba, fas- Die längliche höckerige
cis longitudinalibus undula- Schale hat nach ihrer Länge
tis. wellenförmige Bänder.

Rumph.



Rumph. amb. t. 32. f. S.

Petiv. amb. t. 15. f. 5.

Valent. Abb. 5. t. 39. f.

Gualt. Test. t. 25. f. S.

Seb. Thes. III. t. 47. f. 24.

Knor. Vergn. II. 8. t. 4. f.

Mart. Conch. Kab. II. 53. t. 581. 583.

C. IV. 2. *Conus bulla-*

C. IV. 2. Die Wolfens-

rus.

backe.

Linn. S. N. Sp. 322.

Belg. Wolkbakje.

Testa oblonga, nebulosa

Die länglichte neblichte

columella flexuosa, emargi-

Schale hat eine gedrehte ein-

nata.

gesäumte Spindel.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 1. f. 43.

Gualt. Test. t. 26. f. C.

Adans. Seneg. Pl. 5. f. 1.

Knor. Vergn. V. 8. t. 2. 3. f.

Mart. Conch. Kab. II. 65. t. 726. 727. f.


C. IV. 3. *Conus Tulipa.*

C. IV. 3. Die Tulpe.

Linn. S. N. Sp. 323.

K 5

Belg.



Belg. Achaat toot. Angl. The Tulip - Shell Hill. Gall. La Tulipe.
Argenv.

Testa oblonga lacui, aper- Die längliche glatte Schale
tura patente, anfractibus su- hat eine weite Mündung, und
premis coronatis. die obersten Gewinde gekrönt.

List. Hist. Conch. 1. 4. f. 10. p. 2. f. 7.

Rumph. amb. t. 34. f. K.

Petiv. amb. t. 4. f. 14.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. B.

Seb. Thes. III. t. 42. f. 16, 20. t. 43. f. 20 - 22.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Regenf. Samml. I. 2. t. 20. f.

Knor. Vergn. V. 20. t. 1, 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 718, 719.

C. IV. 4. Conus Geo-
graphus.

C. IV. 4. Die Kronen-
bade.

Linn. S. N. Sp. 324.

Belg. Wolkje. Rumph. Angl. Cloudy - Stamper Petiv. Gall. Brocard
de Soie. Argenv.

Testa oblonga, spira corona-
ta, apertura patente.

Die längliche Schale hat
gekrönte Gewinde, und eine
weite Mündung.

Bonan.



Bonan. Recr. cl. 3. f. 319.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. I. f. 41.

Petiv. Gaz. t. 98. f. 8.

— *amb. t. 15. f. 3. A.*

Rumph. amb. t. 31. f. G.

Gualt. Test. t. 26. f. E.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. A.

Adans. Seneg. t. 6. f. 8.

Seb. Thes. III. t. 42. f. 1 — 4.

Knor. Vergn. III. 21. t. 2. f.

— — *VI. 17. t. 3. f.*

Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 717. f.

D. Cypraea.

D. Die Porzellanschnecke.

Linn. S. N. Gen. 320.

Testa conuoluta, sub-
 ovata, apertura longitudi-
 nali, utrinque denticulata,
 extremitatibus effusis.

Die Schale ist zusam-
 mengerollet, einigermaßen
 eysförmig, ihre Mündung,
 welche der Länge nach be-
 rabläuft, ist beiderseits ge-
 zähnel, und an den En-
 den ausgeschnitten.