

HISTOIRE NATURELLE DES COQUILLES,

Contenant leur description , les mœurs des
animaux qui les habitent et leurs usages.

avec figures dessinées d'après nature.

PAR L. A. G. BOSCH,

Membre des Sociétés d'Histoire Naturelle de
Paris , Bordeaux et Bruxelles ; de la Société
Philomatique de Paris ; de la Société Linnéenne
de Londres , et de l'Académie de
Turin.

T O M E V.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELLI

A PARIS,

Chez DETERVILLE, rue du Battoir , n° 16

A N X.

Favanne, pl. 29. fig. R. 2.
On ignore son pays natal.

Porcelaine naine, *Cypræa pusilla*.
Bleuâtre, tachée de brun, et fasciée.
Dargenville, pl. 18. fig. 1.
On ignore son pays natal.

CONE, *Conus*, *Linnæus*.

Coquille univalve, contournée, conique; ouverture longitudinale, linéaire, édentée, versante, terminée au sommet par une échancrure; columelle lisse; base droite, ouverture rarement échancrée

Les cônes forment un des genres les plus naturels, les plus nombreux, les plus brillans de la Conchyliologie, mais aussi un des plus difficiles à étudier, à raison de la multitude de variétés que présentent les espèces, et de la confusion qui résulte, dans les auteurs, des erreurs auxquelles elles ont donné lieu.

Heureusement pour les amateurs de la science, le chaos qu'il présentait dans

Linnæus et autres ouvrages systématiques, a été débrouillé par Hwass, le possesseur du plus riche cabinet de coquilles qui existe peut-être dans le monde, et que son traité a été imprimé, par Bruguière, dans l'Encyclopédie méthodique. La science doit beaucoup profiter de cet excellent et pénible travail, que peu de personnes pouvoient se flatter d'être en état de conduire au même degré de perfection.

La forme des espèces de ce genre est si peu variée, et leurs couleurs sont si inconstantes, qu'il sera toujours très-difficile de les déterminer d'une manière certaine, même avec des figures, si on n'a pas à sa disposition un cabinet assez riche pour pouvoir faire de nombreuses comparaisons. Ainsi donc, il ne faut considérer l'extrait du travail de Hwass, qu'on va donner ici, que comme une simple indication qui facilitera les moyens d'étudier, mais qui ne peut suffire pour apprendre à connoître les

cônes; car l'Encyclopédie leur consacre 171 pages *in-4°*. Et en la lisant, on desire encore de plus grands détails pour beaucoup d'espèces.

Le genre cône, quelque naturel qu'il soit, a éprouvé quelques variations. Les anciens Conchyliologistes les ont divisés en trois ou quatre familles, que les Français ont appelés *cornets*, *volutes*, *rouleaux*, *cylindres* ou *pyramides*; mais il n'est plus, en ce moment, nécessaire de s'occuper de cet objet.

Tous les cônes sont donc, comme l'indique leur nom, de forme conique plus ou moins exacte. Les uns, et c'est le plus grand nombre, sont lisses; les autres sont granuleux, striés, etc. mais tous sont d'une contexture solide, qu'ils doivent autant à leur épaisseur qu'à leur forme. Leur spire est plus ou moins saillante; leur ouverture toujours parallèle à la longueur de leur coquille, et sous la forme d'une fente étroite fort allongée, puisqu'elle occupe toute la

longueur de leur tour extérieur. Elle est plus ouverte vers son extrémité inférieure qu'à la supérieure dans quelques espèces; mais, en général, elle est d'autant plus étroite, que la coquille est plus réellement conique. Adanson a reconnu qu'elle est en partie fermée par un petit opercule.

Toutes les coquilles de ce genre portent une échancrure sensible à l'extrémité supérieure de leur ouverture, qui est plus ou moins prononcée, suivant les espèces. On en voit quelques-unes où cette échancrure a la figure d'une portion de cercle assez élargie, et d'autres où elle ressemble à une fente étroite et profonde, qui fait, dans cette partie, la séparation des deux lèvres. On trouve cette échancrure dans tous les cônes qui n'ont point passé par les mains des marchands, qui quelquefois la font disparaître pour cacher un défaut ou multiplier les espèces frauduleuses.

Ce que l'on sait de plus précis sur la

forme de l'animal du cône, se trouve dans Adanson. Cet auteur a reconnu que sa tête étoit très-petite, cylindrique, de longueur et de largeur égales, tronquée obliquement en dessous, à son extrémité; qu'elle fait corps avec le col, lequel sort, quelquefois du double de sa longueur, hors de la coquille. Suivant lui, il part, des deux côtés de la tête et de son origine, deux cornes cylindriques terminées par une pointe très-courte; les yeux sont deux petits points noirs placés du côté extérieur des cornes, fort près de la pointe, et qui ne saillent pas au-dehors. La bouche est un petit trou rond, ouvert, au milieu d'une large fossette creusée sous l'extrémité de la tête: cette fossette fait, comme dans la sangsue, l'office d'un suçoir, par lequel la tête s'attache facilement aux corps qu'elle touche. L'animal a besoin de ce secours, observe Adanson, pour faciliter le transport de sa coquille, qui est d'une pesanteur et

d'un volume peu proportionné à la petitesse de son corps. Son manteau tapisse les parois intérieures de la coquille, et sort, par l'échancrure, sous la forme d'un tuyau cylindrique, dont la longueur égale la cinquième partie de la coquille, et surpasse un peu celle des cornes : ce tuyau est fendu par-devant dans toute sa longueur, et se rejette en dessus, sur la gauche. Le pied est elliptique, obtus, et arrondi à ses extrémités : sa longueur est triple de sa largeur, et égale aux deux tiers de la coquille : un profond sillon le traverse dans son extrémité extérieure, et le reste de sa surface est ridé. A l'extrémité postérieure est le petit opercule dont il a déjà été parlé, qui est attaché en dessus par la moitié d'en bas seulement, le reste étant libre et détaché : c'est un petit disque elliptique de corne fort mince.

On peut conclure de cette description, que cet animal diffère de celui des

autres coquilles univalves principalement par la situation des yeux, et que c'est des buccins dont il se rapproche le plus.

Tous les cônes sont recouverts, en sortant de la mer, d'un épiderme plus ou moins épais, ce qui les éloigne beaucoup des volutes, qui en sont privées, quoique soit rapprochées d'eux par les autres caractères.

C'est dans les climats les plus chauds et sur les côtes sablonneuses qu'on doit chercher les cônes : on n'en rencontre qu'une espèce dans la Méditerranée, et point du tout sur les côtes de l'océan Européen. Les espèces fossiles sont assez nombreuses; on en trouve deux à Courtagnon, et beaucoup en Piémont et en Allemagne, dont les analogues ne sont point encore connus.

Plusieurs cônes joignent à une très-grande beauté, une excessive rareté, et sont par conséquent payés extrêmement chers par ces amateurs qui n'esti-

ment les choses que par le prix qu'elles leur ont coûté. On en cite qui ont été vendus plus de deux mille francs.

Les différences spécifiques, dans ce genre, se tirent principalement de la forme que présente la spire; de la figure bombée, canaliculée ou concave, qui distingue les bords supérieurs de ses tours; des stries dont elle est sillonnée; enfin des couleurs.

Bruguière a divisé ses cônes en trois sections, savoir :

Les cônes dont la spire est couronnée.

Les cônes coniques.

Les cônes cylindriques.

Les cônes ont été figurés pl. 315 à 349 de l'Encyclopédie.

A coquille couronnée.

Cône cédonuli, *Conus cedonuli*.

Conique, fascié par des taches séparées ou réunies; marqué de plusieurs lignes

circulaires ponctuées ; la spire concave , aiguë.

Dargenville, Supp. pl. 1. fig. H. et 10. *Favan.* pl. 16. fig. D. C. D. 7. D. 1. D. 6. D. 3. *Martini*, 2. tab. 57. fig. 655. 62. fig. 682. 10. tab. 111. fig. 1306. 1310.

Se trouve dans les mers de l'Inde et d'Amérique.

Cône écorce d'orange, *Conus aurantius*.

Conique , rarement granuleux , brun ou jaune , marbré de blanc ou de brun ; la spire aiguë.

Lister, tab. 775. fig. 21. *Gualt.* tab. 20. fig. L. *Favanne*, pl. 16 fig. D. 4. *Mart.* 2. tab. 61. fig. 679.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône damier, *Conus marmoratus*.

Oblong , rarement granuleux , noir , marqué de taches blanches , presque triangulaires ; la spire obtuse , canaliculée.

Lister, tab. 787. fig. 39. *Gualt.* tab. 22. fig. D. *Dargenv.* pl. 12 fig. M. O. *Favanne*, pl. 14. fig. E. 4. *Martini*, 2. tab. 62. fig. 685 , 686. 10. tab. 138. fig. 1279.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône papier marbré, *Conus nebulosus*.

Conique , rarement granuleux , brun ou jaune , marbré de brun ou de blanc ; la spire aiguë.

116 HISTOIRE NATURELLE

Lister, tab. 759. fig. 4. *Gualt.* tab. 21.
fig. Q. L. M. *Dargenv.* pl. 12. Supp. pl. 1.
fig. R. *Favanne*, pl. 16. fig. E. 4. E. 5. E. 2.
Martini, 2. tab. 62. fig. 683. 61. fig. 677.
678.

Se trouve dans l'océan Américain et à Madagascar.

Cône Banda, *Conus Bandanus*.

Conique, noirâtre, marqué de petites taches blanches presque triangulaires, coloré de rose et de brun clair; la spire comprimée, mucronée.

Séba, 3. tab. 55. fig. 25. *Knorr*, Verg. 1. tab. 7. fig. 4. *Favanne*, Catal. fig. 521.

Se trouve dans l'océan Indien.

Cône nocturne, *Conus nocturnus*.

Conique, noirâtre, marqué de taches blanches cordées, jointes entr'elles et déposées en fascies; la spire obtuse; la base granuleuse.

Séba, 3. tab. 46. fig. 5. 12. *Favanne*, pl. 14. fig. E. 3. *Martini*, 2. tab. 62. fig. 687, 688.

Se trouve aux Moluques.

Cône Nicobar, *Conus Nicobaricus*.

Conique, noirâtre, fascié par des taches nombreuses blanches, chantournées de brun; la spire comprimée, canaliculée, mucronée; le dedans de l'ouverture jaune.

Martini, 10. tab. 139. fig. 1292.

Se trouve dans l'océan Indien.

Cône esplandian, *Conus araneosus*.

Conique, blanchâtre, treillissé par des lignes brunes ou noirâtres, marqué quelquefois de deux zones foncées; la spire obtuse, canaliculée, mucronée.

Dargenville, Supp. pl. 1. fig. T. *Favan.* pl. 17. fig. P. *Martini*, 2. tab. 61. fig. 676. et 10. tab. 144. fig. C. D.

Se trouve aux Moluques.

Cône zonal, *Conus zonatus*.

Conique, d'un violet cendré, marqué de plusieurs rangs de taches carrées, blanches, et de lignes parallèles, couleur de safran; la spire obtuse, presque tronquée.

Favanne, pl. 14. fig. E. *Martini*, 10. tab. 159. fig. 1286 à 1288.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône impérial, *Conus imperialis*.

Conique, blanchâtre, garni de fascies olivâtres et de lignes transverses, articulées de blanc et de brun; la spire obtuse, comprimée ou élevée.

Lister, tab. 766. fig. 15. *Gualtieri*, tab. 21. fig. A. *Dargenville*, pl. 12. fig. F. *Favanne*, Catal. pl. 3. fig. 557. *Martini*, 2. tab. 62. fig. 690.

Se trouve aux Moluques.

Cône maur, *Conus fuscatus*.

Conique, noirâtre, taché de blanc, gar-

Cône esplandian, *Conus araneosus*.

Conique, blanchâtre, treillissé par des lignes brunes ou noirâtres, marqué quelquefois de deux zones foncées; la spire obtuse, canaliculée, mucronée.

Dargenville, Supp. pl. 1. fig. T. *Favan.* pl. 17. fig. P. *Martini*, 2. tab. 61. fig. 676. et 10. tab. 144. fig. C. D.

Se trouve aux Moluques.

Cône zonal, *Conus zonatus*.

Conique, d'un violet cendré, marqué de plusieurs rangs de taches carrées, blanches, et de lignes parallèles, couleur de safran; la spire obtuse, presque tronquée.

Favanne, pl. 14. fig. E. *Martini*, 10. tab. 159. fig. 1286 à 1288.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône impérial, *Conus imperialis*.

Conique, blanchâtre, garni de fascies olivâtres et de lignes transverses, articulées de blanc et de brun; la spire obtuse, comprimée ou élevée.

Lister, tab. 766. fig. 15. *Gualtieri*, tab. 21. fig. A. *Dargenville*, pl. 12. fig. F. *Favanne*, Catal. pl. 3. fig. 557. *Martini*, 2. tab. 62. fig. 690.

Se trouve aux Moluques.

Cône maur, *Conus fuscatus*.

Conique, noirâtre, taché de blanc, gar-

118 HISTOIRE NATURELLE

ni de lignes transverses interrompues, noires ; la spire obtuse.

Favanne, pl. 14. fig. A. 4. *Martini*, 10. tab. 139. fig. 1289.

Se trouve dans l'océan Indien et Africain.

Cône royal, *Conus regius*.

Conique, couleur de rose, marqué de lignes longitudinales, ramifiées d'un pourpre foncé ; la spire convexe.

Favanne, pl. 17. fig. B. *Martini*, 10. tab. 138. fig. 1276.

Se trouve dans l'océan Asiatique : c'est un des plus rares et des plus chers.

Cône papier turc, *Conus minimus*.

Conique, glauque, taché de fauve, marqué de lignes transverses, articulées de blanc et de brun ; la spire obtuse.

Martini, 2. tab. 63. fig. 73 à 75.

Se trouve dans l'océan Indien.

Cône cannelé, *Conus sulcatus*.

Conique, profondément canelé, blanc ; la spire obtuse.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône hébraïque, *Conus hebraeus*.

Conique, blanc, quelquefois rosé, marqué de taches transverses, presque carrées, noires ; la spire convexe.

List. tab. 779. fig. 25, 26. *Gualt.* tab. 25.

fig. T. Q. *Dargenv.* pl. 12. fig. G. *Adanson*, pl. 6. fig. 5. *Favanne*, pl. 14. fig. B. 2. B. 2. *Martini*, 2. tab. 144. fig. A. q. r. 10. tab. 63. fig. 699, 700.

Se trouve dans toutes les mers, entre les Tropiques.

C. piqûre de mouche, *Conus arenatus*.

Conique, presque ovoïde, blanc, parsemé de piqûres noires, disposées en masses; la spire obtuse, mucronée ou aiguë; la base échancrée.

Lister, tab. 761. fig. 10. *Gualtieri*, tab. 15. fig. P. *Favan.* pl. 15. fig. F. 2. F. 3. *Mart.* 2. tab. 63. fig. 696, 697.

Se trouve aux îles Philippines.

Cône piqûre de puces, *Conus pulicarius*.

Conique, blanc, marqué de points bruns foncés, et d'une zone fauve; la spire comprimée, mucronée; la base échancrée.

Lister, tab. 774. fig. 20. *Martini*, 2. tab. 63. fig. 698.

Se trouve autour des îles de la mer du Sud.

Cône fustigé, *Conus fustigatus*.

Conique, blanc, marqué de gouttes noires, inégales; la spire comprimée, mucronée; la base échancrée.

Gualt. tab. 21. fig. C. *Favanne*, pl. 15. fig. F. C. *Martini*, 2. tab. 63. fig. 698. A.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône civette, *Conus obesus*.

Conique, d'un blanc nué de rose, marqué de taches, de points et de nébulosités violettes; la spire concave, obtuse; la base échancrée.

Favanne, Catal. fig. 461. *Martini*, 10. tab. 142. fig. 1518.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône peau de chagrin, *Conus varius*.

Conique, muriqué ou granuleux, blanc, taché le plus souvent de marron; la spire aiguë.

Dargenville, pl. 12. fig. R. *Favanne*, pl. 16. fig. E. 5. *Martini*, 10. tab. 158. fig. 1284.

Se trouve dans les mers de l'Inde et de l'Amérique.

Cône taffetas, *Conus tulipa*.

Oblong, rougeâtre, varié d'ondulations blanches et bleues, marqué de lignes nombreuses circulaires, brunes, ponctuées de blanc; la spire obtuse; l'ouverture large.

Lister, tab. 764. fig. 13. *Gualtieri*, tab. 26. fig. C. *Adanson*, pl. 6. fig. 8. *Fav.* pl. 19. fig. 442. *Mart. L. L.* 2. tab. 64. fig. 718, 719. tab. 65. fig. 720, 721.

Se trouve dans toutes les mers, entre les Tropiques.

Cône brocard, *Conus geographus*.

Oblong, marqué de nébulosités blanches

et fauves , et quelquefois d'un réseau blanc et brun ; la spire obtuse ; l'ouverture élargie vers le bas.

Lister, tab. 747. fig. 41. *Gualt.* tab. 26. fig. E. *Dargenville*, pl. 13. fig. A. *Favanne*, pl. 19. fig. L. 1. *Martini*, 2. tab. 64. fig. 717.

Se trouve dans les mers de l'Inde.

Cône ponctué, *Conus punctatus*.

Conique , rougeâtre , fascié de blanc , marqué de stries élevées , ponctuées de rouge ; la spire convexe , tachée de brun.

Martini, tom. 10. tab. 139. fig. 1249.

Se trouve dans l'océan Africain.

Cône musique, *Conus tæniatus*.

Conique , blanc , fascié de violet , marqué de lignes transverses entrecoupées de brun et de blanc ; la spire obtuse.

Martini, vol. 2. tab. 57. fig. 632. 10. tab. 144 fig. m. n.

Voyez pl. 40 , fig. 1 , où il est représenté au tiers de sa grandeur naturelle.

Se trouve dans les mers de la Chine.

Cône bluet, *Conus musicus*.

Conique , blanc , marqué d'une zone bleuâtre , et de lignes transverses ponctuées de brun ; la spire obtuse.

Se trouve dans les mers de la Chine.

Cône miliaire, *Conus miliaris*.

Conique , couleur de chair ; zoné de

blanc, marqué de deux fascies livides, composées de lignes blanches et brunes; la spire obtuse.

Favanne, Catalogue de Latour-d'Auvergne, fig. 572.

Se trouve dans les mers de la Chine.

Cône souris, *Conus mus*.

Conique, strié, cendré, fascié de blanc, marqué de taches fauves longitudinales; la spire aiguë.

Gnalt. Ind. tab. 29. fig. R.

Se trouve dans l'océan Américain.

Cône livide, *Conus lividus*.

Conique, d'un verd livide; la spire obtuse; le sommet couleur de rose; la base muriquée.

Knorr, 4. tab. 13. fig. 3. *Favanne*, pl. 16. fig. M. *Martini*, 2. tab. 65. fig. 69+. et tab. 61. fig. 681.

Se trouve dans l'océan Américain.

Cône gourgouran, *Conus barbadensis*.

Conique, légèrement sillonné, rougeâtre, fascié de blanc; la spire obtuse; la base granuleuse.

Lister, tab. 784. fig. 31. *Martini*, vol. 2. tab. 65. fig. 707.

Se trouve dans l'océan Américain.

Cône cardinal, *Conus cardinalis*.

Conique, granuleux, incarnat, marqué

d'une zone blanche, tachée de brun; la spire aplatie.

Knorr, 5. table 17. fig. 5. *Martini*, 2. tab. 61. fig. 680. *Favanne*, vol. 2. pl. 16. fig. I.

Se trouve dans l'océan Indien et Américain.

C. magellanique, *Conus magellanicus*.

Conique, orangé, marqué d'une fascie ponctuée de blanc et de fauve; la spire tronquée.

Favanne, pl. 16. fig. H.

Se trouve au détroit de Magellan.

Cône distant, *Conus distans*.

Conique, jaunâtre, marqué de lignes creuses écartées; la spire convexe, tachée de blanc et de brun; la base violette.

Martini, tom. 10. tab. 158. fig. 12. 81

Se trouve dans la mer du Sud.

Cône calédonien, *Conus caledonicus*.

Conique, orangé, marqué de fils très-fins d'un rouge foncé, parallèles et contigus; la spire aiguë.

Se trouve dans la mer du Sud.

Cône époux, *Conus sponsalis*.

Conique, jaune, marqué de deux fascies composées de taches fauves oblongues séparées; la spire convexe, aiguë; la base granuleuse, noirâtre à l'intérieur.

Se trouve dans la mer du Sud.

Cône piqué, *Conus puncturatus*.

Conique, livide, marqué vers le haut d'une zone blanche, et ailleurs de sillons très-finement ponctués; la spire obtuse, le sommet couleur de rose, le fond de l'ouverture violet.

Se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Cône maculé, *Conus maculatus*.

Conique, couronné, blanc, avec deux rangées de taches rouges, longitudinales, irrégulières; plusieurs cercles de petits tubercules vers la base; l'intérieur violet.

Encyclop. pl. 322. fig. 1.

Voyez la pl. 40, fig. 5, où il est représenté de grandeur naturelle.

On ignore son pays natal: il vient de la collection de Hwass, qui a permis à Daudin de le décrire et de le faire dessiner.

Cône lamelleux, *Conus lamellosus*.

Conique, légèrement sillonné, blanc, taché de rose; la spire aiguë, canaliculée et garnie de lamelles en croissant; la base granuleuse.

Se trouve autour de l'île de Ceylan.

C. antdiluvien, *Conus antdiluvianus*.

Conique, légèrement sillonné, strié transversalement; la spire aiguë, très-élevée, égalant le tiers de sa longueur; la base sillonnée.

Cette coquille n'a encore été trouvée que fossile, et n'est pas figurée : elle vient de Courtagnon.

Coquille conique, spire lisse.

Cône tigre, *Conus litteratus.*

Blanc, marqué de fascies jaunes et de plusieurs rangs de taches brunes ; la spire plane, obtuse.

Gualtieri, tab. 21. fig. O. *Dargenville*, pl. 12. fig. I. *Favanne*, pl. 18. fig. A. 1. A. 2. A. 5. *Martini*, 2. tab. 60. fig. 668. 667.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône pavé, *Conus eburneus.*

Blanc, marqué de fascies jaunes, peu apparentes, et de taches transverses lauves ; la spire obtuse ; la base sillonnée.

Lister, tab. 774. fig. 20. *Gualt.* tab. 22. fig. F. *Martini*, 2. tab. 61. fig. 674.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône mosaïque, *Conus tessellatus.*

Blanc, marqué de plusieurs rangs de taches écarlates ou de taches informes, couleur minime ; la spire plane, obtuse ; la base sillonnée, violette dans l'intérieur.

Lister, tab. 767. fig. 17. *Gualtieri*, tab. 21. fig. H. *Favanne*, pl. 16. fig. A. 2. *Martini*, 2. tab. 59. fig. 655, 654.

Voyez la pl. 40, fig. 6, où il est représenté

avec son animal , un peu plus petit que nature.

Se trouve dans la mer des Indes

Cône flamboyant, *Conus generalis*.

Brun ou orangé , marqué de fascies blanches interrompues , ou blanc taché de brun ; la spire applatie , très-élevée au centre ; la base noire.

Lister, tab. 786. fig. 35. *Gualt.* tab. 20. fig. G. *Favanne*, pl. 14. fig. K. 2. *Martini*, 2. tab. 58. fig. 649. 652.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône maldive, *Conus maldivus*.

Couleur de rouille , marqué de taches blanches triangulaires et de plusieurs lignes brunes ponctuées de blanc ; la spire canaliculée ; le sommet élevé ; la base noire.

Favanne, tom. 2. pl. 15. fig. C. *Catalog.* fig. 750.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône malaca, *Conus malacanus*.

Blanc , fascié de safran , marqué de quelques lignes transverses , articulées de fauve et de blanc ; la spire obtuse , bordée ; le sommet élevé.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône filcur, *Conus lineatus*.

Blanc , marqué de taches longitudinales

brunes et de fils nombreux transverses interrompus ; la spire obtuse ; la base granuleuse.

Favanne, tom. 2. pl. 15. fig. 52. *Martini*, 10. tab. 138. fig. 1285.

Se trouve dans l'océan Indien.

Cône faisan, *Conus monile*.

Rubicond, marqué d'une fascie blanche ponctuée, de lignes transverses et de taches sériales d'un rouge foncé ; la spire plane, canaliculée ; le sommet élevé.

Knorr, 3. tab. 6. fig. 3. *Martini*, tom. 10. tab. 140. fig. 1301 — 1305.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône centurion, *Conus centurio*.

Blanc, marqué de fascies ramifiées d'un rouge tirant sur le brun ; la spire concave, obtuse.

Martini, 2. tab. 59. fig. 655. *Valentin*, fig. 48. *Favanne*, tom. 2. pl. 14. fig. K. 1.

Se trouve dans la mer des Antilles.

Cône vitulin, *Conus vitulinus*.

Fauve, marqué de fascies blanches coupées longitudinalement par des lammes brunes ; la spire obtuse.

Favanne, tom. 2. pl. 15. fig. R.

Se trouve dans la mer des Antilles.

Cône renard, *Conus vulpinus*.

Fauve ; la spire canaliculée, plane, ob-

tuse ; la base granuleuse ; le fond de l'ouverture violet.

Born. Mus. cæs. tab. 7. fig. 13.

Se trouve sur les côtes de Guinée.

Cône rouillé , *Conus ferrugineus.*

Couleur de rouille , marqué d'une fascie blanche , et de fils fauves peu apparens ; la spire obtuse.

Lister, tab. 784. fig. 31. *Martini*, tom. 1. tab. 59. fig. 659.

Se trouve sur les côtes de Guinée.

Cône cierge , *Conus virgo.*

Janne ; la spire plane , obtuse ; la base violette.

Rumph. tab. 31. fig. E. *Gualtieri*, tab. 20. fig. A. B. *Pavanne*, tom. 2. pl. 15. fig. P. Q. *Martini*, tab. 53. fig. 586.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône carotte , *Conus daucus.*

Rouge ou jaune , taché ou fascié de blanc ; la spire plane , obtuse ; le sommet couleur de rose.

Gualt. tab. 20. fig. I. *Fav.* tom. 2. pl. 15. fig. O. *Mart.* 10. tab. 144. fig. A. L. 2. tab. 53. fig. 587.

Se trouve dans la mer des Antilles.

Cône capitaine , *Conus capitaneus.*

Jaune , verdâtre , marqué de deux fascies

blanches, tachées de brun; la spire légèrement convexe.

Lister, tab. 780. fig. 27. 28. *Gualt.* tab. 22. fig. 11. *Dargenville*, pl. 15. fig. K. *Fav.* pi. 15. fig. A. *Mart.* 2. tab. 59. fig. 660 à 662.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône hermine, *Conus mustellinus*.

Verdâtre, marqué de deux fascies blanches; la fascie supérieure variée de noir, l'inférieure accompagnée de deux rangs de taches noirâtres; la spire plane, obtuse.

Séba, 3. tab. 42. fig. 31. *Favan.* pl. 15. fig. A. 2. *Mart.* 10. tab. 158. fig. 1220.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône loup, *Conus sumatrensis*.

Blanchâtre, marqué de lignes brunes rameuses, réunies; la spire obtuse.

Lister, tab. 781. fig. 28. *Séba*, 3. tab. 42. fig. 26. *Martini*, 10. tab. 144. fig. A. B.

Se trouve dans les mers des Indes.

Cône hyène, *Conus hyæna*.

Jaunâtre, marqué d'une zone blanche de points et de lignes fauves interrompues; la spire convexe, mucronée.

Lister, Synop. tab. 776. fig. 22.

Se trouve à la côte d'Afrique.

Cône navet, *Conus miles*.

Épais, d'un jaune pâle, marqué de fas-

130 HISTOIRE NATURELLE

cies couleur de bistre et de fils onduleux, longitudinaux, fauves; la spire plane, obtuse; la base noirâtre.

Lister, tab. 786. fig. 34. *Rumph.* tab. 23. fig. W. *Gualtieri*, tab. 20. fig. N. *Dargenville*, pl. 16. fig. L. *Favanne*, pl. 15. fig. 80. *Martini*, 2. tab. 59. fig. 663, 664.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône amiral, *Conus ammiralis*.

Brun citron, marqué de taches blanches, presque triangulaires, et de fascies fauves peintes en réseau très-fin; la spire concave, aiguë.

Rumphius, tab. 34. fig. C. *Séba*, 3. tab. 48. fig. 4 à 6. *Dargenville*, pl. 12. fig. H. pl. 15. fig. N. Supp. pl. 1. fig. P. M. V. *Favanne*, pl. 17. fig. I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. I. 6. I. 7. *Martini*, 10. tab. 141. fig. 1509. 1507. 2. tab. 26 fig. 2. tab. 57. fig. 675.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône siamois, *Conus siamensis*.

Jaunâtre, marqué de fascies blanches et de plusieurs zones articulées de fauve et de blanc; la spire obtuse et mucronée.

Rumphius, tab. 34. fig. E. *Séba*, 3. tab. 46. fig. 20, 21. *Favanne*, tom. 2. pl. 16. fig. B.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône aile de papillon, *Conus genuanus*.

Rubicond, marqué de plusieurs zones

inégaies , articulé de brun et de blanc ; la spire plane , convexe , mucronée.

Lister , tab. 769. fig. 17. *B. Rumphius* , tab. 34. fig. G. *Gualtieri* , tab. 22. fig. H. *Dargenville* , pl. 12. fig. V. *Favanne* , pl. 14. fig. I. 3. *Martini* , 2. tab. 56. fig. 624 , 625. 625.

Voyez pl. 16 , fig. 4 , où il est représenté de grandeur de moitié de nature.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Cône papilionacé , *Conus papilionaceus*.

Blanc , zoné de taches et de points fauves ; la spire convexe , légèrement canaliculée , mucronée.

Gualt. tab. 22. fig. C. *Lister* , tab. 767. fig. 16. 773 fig. 19. *Dargenville* , pl. 22. fig. Q. *Favanne* , pl. 14. fig. I. 1. *Martini* , 2. tab. 669. 10. tab. 138 fig. 1282 , 1285.

Se trouve dans l'Océan Indien.

Cône Prométhé , *Conus Promethicus*.

Oblong , blanc , marqué de zones interrompues couleur d'azur ; la spire convexe , légèrement canaliculée , mucronée.

Lister , tab. 771. fig. 17. *Gualt.* tab. 12. fig. B. *Favanne* , tom. 2. tab. 15. fig. 1.

Se trouve sur les côtes de l'Afrique orientale.

Cône glauque , *Conus glaucus*.

Glauque , marqué de lignes transverses , fauves , interrompues ; la spire convexe , tachée de brun ; la base échancrée , striée ;

le bord interne de la lèvre droite couleur de rouille.

Rumphius, tab. 35. fig. G. G. *Séba*, 3, tab. 54. fig. 9. *Favanne*, tom. 2. pl. 15. fig. D. 2. *Martini*, 10. tab. 138. fig. 1277, 1278.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône surate, *Conus suratensis*.

Fauve, marqué de taches transverses, linéaires, brunes; la spire convexe, mucronée, tachée de brun; la base échan-crée, striée.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône moine, *Conus monachus*.

Ovale, ondé de brun et de blanc cendré, quelquefois marqué de zones articulées; la spire aiguë; la base sillonnée.

Régenf. 1. tab. 12. fig. 68. *Knorr*, tom. 3. fig. 2, 3.

Se trouve dans l'océan Oriental.

Cône renoncule, *Conus ranunculus*,

Ovale, rouge, marqué de stries élevées, ponctuées et de nébulosités blanches; la spire obtuse.

Séba, Thes. tom. 3. tab. 43. fig. 56.

Se trouve dans l'océan Américain.

Cône agathe, *Conus uchatinus*.

Ovale, brun, taché de blanc, souvent

marqué de lignes ponctuées interrompues ou de fils bruns ; la spire aiguë ; la base raboteuse.

Rumphius, tab. 34. fig. L. *Séba* 3. tab. 48. fig. 380. *Dargenville*, pl. 13. fig. B. *Favanne*, tom. 2. pl. 19. fig. M. 2. *Martini*, 2. tab. 55. fig. 613. 10. tab. 142. fig. 1320.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône taupin, *Conus cinereus*.

Ovale, cendré, marqué d'une fascie blanchâtre, nébuleuse, de taches fauves et de plusieurs lignes transverses ponctuées ; la spire convexe, mucronée ; la base sillonnée.

Rumphius, tab. 52. fig. R. *Favanne*, tom. 2. pl. 16. fig. C. 2. *Martini*, 2. tab. 527. fig. 578. 10. tab. 140. fig. 1304.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône réseau, *Conus mercator*.

Ovale, blanc ou jaunâtre, marqué de fascies treillisées de jaune ou de fauve ; la spire convexe.

Lister, tab. 788 fig. 41. 789. fig. 47. *Dargenville*, pl. 12. fig. P. *Favanne*, pl. 14. fig. G. 1. G. 2. G. 3. *Adanson*, pl. 6. fig. 3. *Martini*, 2. tab. 56. fig. 220, 221.

Se trouve sur les côtes occidentales d'Afrique.

Cône tinné, *Conus betulinus*.

Citrin, marqué de plusieurs rangs de ta-coquilles. V.

ches brunes ; la spire convexe , mucronée , tachée de brun ; la base échancrée, ridée.

Lister , tab. 762. fig. 11. *Rumphius* , tab. 31. fig. C. *Gualt.* tab. 21. fig. B. *Favanne* , pl. 16. fig. L. 1. L. 2. *Martini* , 2. tab. 40. fig. 665. 10. tab. 142. fig. 1521. 2. tab. 61. fig. 673.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône minime, *Conus figulinus*.

Couleur de rouille , marqué de fils transverses noirâtres ; la spire convexe , mucronée ; la base échancrée.

Lister , tab. 785. fig. 32. *Gualt.* tab. 20. fig. E. *Dargenville* , pl. 12. fig. A. *Favanne* , pl. 15. fig. D. *Martini* , 2. tab. 56. fig. 656. tab. 59. fig. 658.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône linné, *Conus quercinus*.

Jaune , marqué de lignes transverses très-nombreuses, couleur d'ocre ; la spire plane , obtuse ; la base raboteuse

Gualt. tab. 20. fig. B. *Favanne* , tom. 2. pl. 15. fig. D. 3. *Martini* , 2. tab. 59. fig. 657.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône Protée, *Conus Proteus*.

Blanc , marqué de taches et de points bruns , disposés sur des lignes régulières ; la spire obtuse , mucronée.

Gualt. tab. 22. fig. E. *Dargenville* , pl. 12. fig. C. 1. *Favanne* , pl. 14. fig. C. 1. *Marti-*

ni, 2. tab. 56. fig. 627. 10. tab. 140. fig. 1500.

Se trouve dans l'Océan Américain et Indien.

Cône léonin, *Conus leoninus*.

Blanc, marqué de taches longitudinales irrégulières, brunes, et de gouttes brunes disposées sur plusieurs rangs; la spire plane, canaliculée, mucronée.

Gualt. tab. 21. fig. D. *Favanne*, tom. 2. pl. 14. fig. I. 1. *Martini*, 2. tab. 57. fig. 640. 10. tab. 140. fig. 2099.

Se trouve dans la mer d'Amérique.

Cône picoté, *Conus augur*.

Jaunâtre, fascié de brun foncé, marqué de plusieurs rangs de points obscurs intimement nombreux; la spire obtuse.

Lister, tab. 755. fig. 7. *Dargenville*, Suppl. pl. 9. fig. 5. *Favanne*, pl. 17. fig. E. 2. *Martini*, 2. tab. 58. fig. 641.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône piqué, *Conus pertusus*.

Rose, fascié d'incarnat, marqué de nébulosités blanches, tirant sur le bleuâtre, et de sillons circulaires, piquées; la spire convexe.

Kammer, tab. 5. fig. 4.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône foudroyant, *Conus fulgurans*.

Blanchâtre, marqué de taches longitudi-

nales en zigzags et de gouttes transversales couleur d'ocre ; la spire concave , aiguë .

Favanne, tom. 2. pl. 17. fig. D. *Martini*, 2. tab. 58. 644.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Cône Rumphius, *Conus acuminatus*.

Blanc , treillissé de brun , marqué d'une fascie simple ou divisée : rarement de deux ; la spire aiguë , canaliculée .

Rumphius, tab. 54. fig. F. *Dargenville*, Supp. pl. 1. fig. L. K. *Favan.* pl. 17. fig. N. 1. N. 2. *Mart.* 2. tab. 57. fig. 638 , 639.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône amadis, *Conus amadis*.

Brun , orangé , parsemé de taches blanches cordées , presque triangulaires , et réunies ; la spire canaliculée ; le sommet saillant .

Dargenville, Supp. pl. 1. fig. 5. *Favan.* tom. 2. tab. 7. fig. M. *Martini*, 2. tab. 58. fig. 642 , 643.

Se trouve dans l'Océan Indien.

Cône Janus, *Conus Janus*.

Blanc , ondulé de fauve et de châtain , quelquefois fascié de blanc ou de brun ; la spire aiguë , canaliculée ; la base sillonnée .

Lister, tab. 785. fig. 33. *Gualt.* tab. 25. fig. S. *Favanne*, tom. 2. tab. 27. fig. O. *Martini*, 2. tab. 58. fig. 647.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

Cône perdu, *Conus deperditus*.

Stries transverses, peu apparentes; la spire aiguë, canaliculée, treillissée par des stries; la base sillonnée.

Dargenville, pl. 29. fig. 8. *Favanne*, pl. 6. fig. G. 1.

On ne la trouve que fossile à Courtagnon, Grignon, et autres lieux.

Cône étourneau, *Conus lithoglyphus*.

Rouge fauve, marqué de deux fascies blanches, écartées, celle de dessus variée de fauve; la spire obtuse; la base granuleuse, noirâtre.

Séba, 3. tab. 42. fig. 40 à 42. *Favanne*, tom. 2. tab. 18. fig. F. *Martini*, 2. tab. 57. fig. 630, 631.

Se trouve dans les mers d'Amérique et de l'Inde.

Cône aumusse, *Conus vexillum*.

Fauve, fascié de blanc, marqué de lignes longitudinales, irrégulières, brunes; la spire obtuse, tachée de brun; le sommet jaune; la base noirâtre.

Rumph. tab. 31. fig. S. *Gualt.* tab. 20. fig. M. et tab. 21. fig. M. *Martini*, tom. 2. tab. 57. fig. 629.

Se trouve dans l'Océan Asiatique.

C. peau de serpent, *Conus testudinarius*.

Blanc ou orangé, marqué de nébulosités brunes et cendrées et de fascies blanches,

Gualt. tab. 22. fig. 2. *Favanne*, pl. 19. fig. M. 5. *Martini*, tom. 2. tab. 54. fig. 612. 6. tom. 10. tab. 140. fig. 1305.

Se trouve dans les mers des Antilles.

Cône chiné, *Conus mauritianus*.

Blanc, taché de fauve, marqué de points bruns alignés, quelquefois parsemés; la spire obtuse; la base sillonnée.

Se trouve dans les mers d'Afrique.

Cône cordelier, *Conus fumigatus*.

Marron, fascié de blanc; la spire obtuse.

Dargenville, pl. 12. fig. D. *Martini*, 2. tab. 56. fig. 618.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Cône à ceinture bleue, *Conus cinctus*.

Légèrement conique; spire lisse, variée de points blancs et bruns; une ceinture d'un bleu pourpré, bordée par une rangée de points noirs, et par deux autres ceintures de même couleur sur un fond gris verdâtre.

Voyez la planche 40, fig. 2, où il est représenté plus gros que nature: De la collection de Famin, du Havre, qui a permis à Daudin de le décrire et faire dessiner.

Cône cerclé, *Conus vittatus*.

Jaune, marqué d'une zone blanche, variée d'orangé; la spire convexe, mucronée.

Knorr, tom. 3. tab. 11. fig. 3.

Se trouve dans l'océan Asiatique.

Cône matelot, *Conus classarius*.

Couleur d'ocre , fascié de blanc et de brun ; la spire obtuse , tachée de brun.

Favan. tom. 2. pl. 14. fig. C. 5.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône chevalier, *Conus eques*.

Blanc , fascié de jaune , marqué de deux rangs de taches fauves ; la spire convexe.

Favanne, tom. 2. pl. 14. fig. F. 1 et 2.

Se trouve sur les côtes de la Floride.

Cône velours, *Conus luzonicus*.

Blanc , marqué de fascies et de points fauves ; la spire aiguë.

Dargenv. Supp. pl. 1. fig. R. *Favanne*, tom. 2. pl. 17. fig. C.

Se trouve dans l'océan Austral.

Cône chat, *Conus catus*.

Blanc , varié de fauve , garni de stries élevées , marquées de points et de taches d'un blanc bleuâtre , quelquefois granuleux ; la spire obtuse.

Knorr, 3. tab. 27. fig. 5. *Martini*, tom. 2. tab. 55. fig. 609 et 610.

Se trouve sur les côtes orientales d'Afrique.

Cône variolé, *Conus verrucosus*

Silloné , granuleux , blanc ou jaune varié de fauve ; la spire élevée.

Knorr, 3. tab. 18. fig. 2. *Martini*, tom. 2. tab. 54. fig. 602.

Se trouve dans la mer des Indes.

Cône abbé, *Conus abbas*.

Orangé, ondé de brun, marqué de zones réticulées de rose, et parsemé de taches rares blanches; la spire aiguë.

Chemnitz in Martini, tom. 10. tab. 145. fig. 1326. b. c.

Se trouve dans la mer des Grandes-Indes.

Cône drap d'or, *Conus textile*.

Jaune, marqué de lignes longitudinales onduleuses brunes, et de taches cordées, blanches, circonscrites de fauve; la spire élevée.

Gualtieri, tab. 25. fig. A. A. *Séba*, 3. tab. 47. fig. 15. 45. fig. 9. *Adanson*, pl. 6. fig. 7. *Dargenville*, pl. 13. fig. F. *Favanne*, pl. 13. fig. B. 1. 3. 4. 5. 8. C. 1. *Martini*, 2. tab. 54. fig. 599, 600.

Voyez la pl. 40, fig. 3, où il est représenté de moitié de grandeur naturelle.


Se trouve dans les mers, entre les Tropiques.

Cône gloire de mer, *Conus gloria*.

Oblong, blanc, fascié d'orange, réticulé par des taches très-nombreuses, triangulaires, blanches, circonscrites de brun; la spire aiguë, élevée.

Naturf. 3. tab. 8. fig. A. *Chemnitz in Martini*, tom. 10. tab. 145. fig. 1324 et 1325.

Se trouve dans la mer des Indes.



Deceve del

Berthault Sculp.

1. Le Cone musique. 4. Le Cone aile de Papillon
2. Le Cone à ceinture blanc. 3. Le Cone maculé.

