

valde impressa; anfr. 9 convexi, primi 3-4 agglutinatione carentes, ultimus spira multo minor, subrotundatus, vix brevissime solutus; apertura subcircularis, intus albida; peristoma continuum, subacutum.— Long. 3 1/4, diam. maj. 3/4 millim. (Coll. Crosse et Marie.)

Habitat in vicinio civitatis Noumea dictæ, Novæ Caledoniæ. (E. Marie.)

Obs. Species, ad genus in Nova Caledonia hactenus nondum repertum pertinens, a speciebus & notis, Japoniæ incolis, distinguenda.

2. HELIX MULTISULCATA, Gassies.

Var. ε. Depressa, transversim rare et obsolete sulcata, forma typica paulo minor, olivaceo-fulvida, zonis saturationibus parum conspicuis, longitudinalibus obscure picta; spira planata; sutura profunde impressa; anfr. 4 vix convexiusculi, ultimus in vicinio suturæ lævigatus, mox spiraliter rare sulcatus, infra peripheriam lævis, nitidior.— Diam. maj. 10 1/2, min. 9, alt. 4 mill. (Coll. Crosse et Marie.)

Habitat in monte « Mou » dicto, Novæ Caledoniæ. (E. Marie.)

H. C.

Description d'espèces nouvelles de **Coquilles** **marines** des côtes d'**Australie**,

PAR JOHN BRAZIER, C. M. Z. S. L. (1).

1. CONUS COOKI.

T. turbinata, crassiuscula, inflata, lævis, lineis rufes-

(1) Traduit de l'anglais en latin, sur le manuscrit original, par H. CROSSE.

centibus, undosis longitudinaliter impressa; spira convexa, apice obtuso; anfr. 6 valide spiraliter striati, ultimus albus, lineis rufis, undosis, subgracilibus, longitudinalibus munitus, basi sulcata, albo limbata; apertura subcærulescens; margo externus tenuis, subcrenatus. — Long. 24, diam. maj. 11 mill. (Coll. Brazier et Hargraves.)

Habitat Botany-Bay, Australiæ. (J. Brazier.)

Obs. Species specimini juvenili Coni principis Linnæi aspectu sat similis sed spira haud coronata distinguenda.

2. CONUS ROSSITERI.

T. turbinata, tenuis, sub lente transversim tenuissime striatula, pallide albido-cærulescens, castaneo longitudinaliter maculata; spira convexiuscula, apice acuto; anfr. 7-8, tenuiter striati, ultimus maculis alternatim albis, sagittiformibus, et castaneis, quadratis ornatus, medio zona castanea interrupta, pallide albido subtus limbata fasciatus, basi sulcatus; apertura intus brunneo-albicans; margo externus subflexuosus, albus, brunneo limbatus. — Long. 16, diam. maj. 8 mill. (Coll. Brazier.)

Habitat Botany-Bay, Australiæ. (J. Brazier.)

Obs. Species Cono gilvo Reevei vicina, sed minor et colore distinguenda.

J. B.

Diagnoses Molluscorum novorum,

AUCTORE H. CROSSE.

1. BULIMUS KUHNHOLTZIANUS.

T. rimato-perforata, breviter fusiformi-oblonga, longi-