

CAROLI A LINNÉ
SYSTEMA
NATURAE.

TOM. I. PARS VI.

319. CONUS. *Animal* Limax.*Testa* univalvis, convoluta, turbinata.*Apertura* effusa, longitudinalis, linearis, edentulâ, basi integra.*Columella* laevis.* *Truncati* *f. spira fere truncata.*

harmo- I. C. testa conica fusca: maculis ovatis albis, spirae anfractibus.
reus. bus canaliculatis. *Mus. Lud. Utr.* 550. n. 151.

Olear. mus. t. 31. f. 2.*Mus. Gottwald. t.* 14. f. 104. a. 104. b.*List. Conch. t.* 787. f. 39.*Bonann. recr. et mus. Kirch. 3.* f. 123.*Rumpf mus. t.* 32. f. N. et 1.*Valent. Abb. t.* 3. f. 25. t. 5. f. 43. et t. 7. f. 65. A.*Petiv. garzoph. t.* 47. f. 11.*Guatt. test. t.* 22. f. D.*Argenv. Conch. t.* 12. f. M. O.*Seb. mus. 3. t.* 45. f. 1-4. 13-19. et t. 47. f. 1-4. et t. 22. f. 2. 3.*Knorr Vergn. 1. t.* 7. f. 4. et t. 15. f. 2. et 4. t. 17. f. 1.*Regenf. Conch. 1. t.* 5. f. 53.*Martin. Conch. 2. t.* 62. f. 685. 686.β) *Valent. Abb. t.* 2. f. 10. et t. 5. f. 44.*Knorr Vergn. 1. t.* 7. f. 4.*Seb. mus. 3. t.* 46. f. 5-12.*Martini Conch. 2. t.* 62. f. 687. 688.γ) *Chemn. Conch. 10. t.* 138. f. 1279.δ) *Chemn. Conch. 10. t.* 139. f. 1292.

Habitat in Asia, β) rarior, testa subtiliter striata, interdum atra aut fulva, maculis subtrigonis in β) paucioribus et in fascias confluentibus; spirae paulo clarioris anfractibus emarginatis tuberculato spinosis.

imperia- 2. C. testa albida: fasciis longitudinalibus lividis cingulisque
lis. linearibus albo fuscoque articulatis. *Mus. Lud. Utr.* 550. n. 152.*

Rumpf mus. t. 34. f. H. I. Kroon hoorn.*Argenv. Conch. t.* 12. f. E. F. Corona imperialis.*List. Conch. t.* 766. f. 15.*Valent. Abb. t.* 3. f. 26.

Gualt. test. t. 22. f. A.

Klein. ostr. t. 4. f. 84.

Seb. musf. 3. t. 47. f. 18-21.

Knorr Vergn. 2. t. 11. f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 35.

Martini Conch. 2. t. 62. f. 690-692:

β) Martini Conch. 2. t. 62. f. 693?

γ) Chemn Conch. 10. t. 139. f. 1289.

δ) Chemn. Conch. 10. t. 139. f. 1290. 1291.

Habitat rarior - - - testa satis magna alba, fasciis et plurimum 2. luteis, cingulisque pluribus ex lineis interruptis albis fuscisque confatis, spira plana, magis minusve emarginata, virgisque undulatis fuscis picta.

Reteratus. 3. C. testa conica alba: punctis fuscis. Musf. Lud. Ulr. 55L. n. 153.

Rumpf. musf. t. 3L. f. D. Voluta musicalis.

List. Conch. t. 773. f. 19? t. 774. f. 20.

Bouann. recr. 3. f. 132? 363.

musf. Kirch. 3. f. 357.

Gualt. test. t. 21. f. G. O.

Seb. musf. 3. t. 45. f. 1-5.

Musf. Gottwald. t. 14. f. 101. c. 101. d.

Knorr delíc. t. B. III. f. 4.

Vergn. 1. t. 16. f. 3. 3. t. 3. f. 2. et 4. t. 26. f. 1.

Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 29. et t. 4. f. 46.

Martini Conch. 2. t. 60. f. 666-668.

β) Gualt. test. t. 22. f. B. C.

Seb. musf. 3. t. 44. f. 5. 7. t. 45. f. 8. 9-12-15. et t. 47. f. 25.

Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 4. et 5. t. 24. f. 5.

Martini Conch. 2. t. 669.

Habitat in Oceano asiatico, testa interdum rubella aut flavescente, punctis s. potius maculis subcubicis, in series digestis: fasciis nonnunquam obsolete flavis intersitis, aut in β) lineis spadiceis, spira maculis virgatis fuscis picta, nunc magis plana, nunc magis convexa.

Generalis. 4. C. testa conica nitida: spira plana muricata; anfractibus canaliculatis.

List. Conch. t. 786. f. 35.

Rumpf. musf. t. 33. f. Y.

Petiv. gazoph. t. 27. f. 11.

Valent. Abb. t. 1. f. 9.

Gualt. test. t. 20. f. G.

Argenv. Conch. t. 12. f. T.

zoomorph. t. 3. f. F.

Seb. mus. 3. t. 54. f. 11-13.

Mus. Gottwald. t. 13. f. 100. 100. a.

Olear. mus. t. 31. f. 5.

*Knorr Vergn. 1. t. 7. f. 3. 2. t. 5. f. 2. et 3. t. 17. f. 4. 5.
et t. 18. f. 3. 4.*

Regenf. Conch. 1. t. 6. f. 65.

Martin. Conch. 2. t. 58. f. 645-652.

β) *Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1301-1303.*

*Habitat paulo rarior in India, testa pulla, lutea, flava vel
aurantia, nunc latiore nunc angustiore: fasciis 2-4 albis,
maculis virgatis pictis; Spira albida, maculis virgatis un-
datis varia medio acuminata.*

Virgo. 5. C. testa conica: basi caerulefcente. *Mus. Lud. Ulr. 551.
n. 153.**

List. Conch. t. 753. f. 1. t. 754. f. 2. et t. 758: f. 3.

Rumpf. mus. t. 31. f. E.

Gualt. test. t. 20. f. B.

Bonann. recr. 3. f. 365.

mus. Kirch. 3. f. 356.

Klein. ostr. t. 4. f. 83.

Seb. mus. 3. t. 47. f. 8. 9.

Knorr Vergn. 2. t. 24. f. 4. et 3. t. 22. f. 1.

Mus. Gottwald. t. 13. f. 99. h. et t. 14. f. 105. a. 105. b.

Martin. Conch. 2. t. 53. f. 585-589.

β) *Knorr Vergn. 4. t. 16. f. 5.*

Martin. Conch. 2. t. 63. f. 701. 702.

γ) *List. Conch. t. 767. f. 17.*

Valent. Abb. t. 6. f. 52. et t. 8. f. 73.

Gualt. test. t. 21. f. H.

Seb. mus. 3. t. 55. f. 4-9.

Knorr Vergn. 2. t. 12. f. 3.

Regenf. Conch. 1. t. 8. f. 19.

Martin. Conch. 2. t. 59. f. 653. 654.

δ) *Knorr Vergn. 6. t. 11. f. 4?*

ε) *Chemn. Conch. 10. t. 138. f. 1281.*

*Habitat in Oceano africano, testa laevi flavicante, frequen-
tius nivea, in γ) albo rubroque tessellata, in β) alba:
fascia straminea, spira caerulea, aut caerulea: spira al-
ba; fascia ochroleuca.*

Capita- 6. C. testa conica glabra basi fusca: spira convexiuscula. *Mus.
neus, Lud. Ulr. 552. n. 155.**

List.

- List. Conch.* t. 780. f. 27. t. 781. f. 28?
Valent. Abb. t. 3. f. 22. 23. et t. 6. f. 49.
Mus. Gottw. t. 12. f. 85. b. c. et t. 13. f. 99. c-g.
Knorr Vergn. I. t. 7. f. 6. et t. 15. f. 3. 2. t. 6. f. 3. et 5.
 t. 16. f. 2.
Martini Conch. 2. t. 59. f. 660-662.
 β) *Gualt. test.* t. 20. f. I. .
 γ) *Rumpf mus.* t. 33. f. X.
Argenv. Conch. t. 12. f. K.
Gualt. test. t. 22. f. M.
Regenf. Conch. I. t. 7. f. 7.
 δ) *Bonann. recr.* 3. f. 361.
mus. Kircher. 3. f. 354.
Seb. mus. 3. t. 42. f. 26-36.
 ε) *Bonann. recr. et mus. Kirch.* 3. f. 139.
 ζ) *Valent. Abb.* t. 5. f. 47.
Gualt. test. t. 20. f. Q.
Seb. mus. 3. t. 42. f. 40. 41.
Martini Conch. 2. t. 57. f. 630. 631.
 η) *Feruss. Conch.* 2. t. 15. f. A?
Chemn. Conch. 10. t. 138. f. 1280.
 θ) *Gualt. test.* t. 25. f. F.
Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1298.
 ι) *Chemn. Conch.* 10. t. 144. A. f. a. b.
 κ) *Kacim. Cab. Rudolff.* t. 7. f. 4.
Habitat in Asia, testa olivacea, lutea, fusca, spadicea aut intermedia, variis unicolore frequentius fascia aut 2 albis, maculis virgatis undulatis vel quadratis variis, et praeterea crebro puncturum macularumque seriebus picta, spira variis plana, ut plurimum maculis virgatis varia.

Tribunus. 7. C. testa alba: fasciis tribus flavicantibus spadiceo maculatis, spira convexiuscula, basi transversim striata.

Martini. Conch. 2. t. 59. f. 655.

Habitat - - - *testa lincei spadiceis undulatis varioribus picta.*

Miles. 8. C. testa conica rudi: basi fusca, spira convexa.
Argenv. Conch. t. 12. f. L. Pseudo-Archichalassus.

List. Conch. t. 786. f. 34.

Rumpf mus. t. 33. f. W.

Gualt. test. t. 20. f. N.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 23-25.

Mus. Gottwald. t. 13. f. 99. a 99. b.

Hhh hhh hhh h 4

Knorr

Knorr Vergu. 1. t. 15. f. 4. et 3. t. 1. f. 2. 3.

Martini Conch. 2. t. 59. f. 663. 664.

Habitat in India, testa albida aut flavescente lineis longitudinalibus undulatis notata, basi transversim striata, fascia spiram fusco maculatam versus fusca.

- Cingulum. 72. C. testa conica ex luteo flavicante: cingulo medio elevato solitario, spira acuta. *Mant. univ. Conch. 1. t. 39.*
Habitat ad infulas amicas.

** pyriformes, basi rotundata subcylindrica sesqui-longiore, quam spira.

- Princeps. 9. C. testa flava: lineis fusco purpureis longitudinalibus ramosis. *Mus. Lud. Ulr. 552. n. 156.**

Bouann. recr. et mus. Kirch. 3. f. 138?

Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 30. t. 1. f. 3.

β) *List. Conch. 1. 779. f. 26.*

Gualt. test. 1. 25. f. Q.

Argenz. Conch. 1. 12. f. B.

Seb. mus. 3. t. 47. f. 30. 31.

Knorr Vergu. 3. t. 4. f. 2.

Martini Conch. 2. t. 63. f. 699. 700.

γ) *Chemn. Conch. 10. t. 138. f. 1276.*

Habitat - - - testa 2½ pollices longa: fasciis duabus albis hinc inde fusco maculatis, spira obtusa subtilissime transversim striata, maculis spaduceis, superne atris varia; testa in β) brevior ex atro fusca.

- Ammiralis. 10. C. testa basi punctato-scabra. *Mus. Lud. Ulr. 553. n. 157.**

larvatus. α) fasciis nullis.

Mart. Conch. 2. t. 57. f. 635. a.

americana. β) fasciis irregularibus.

a) testa fusca albo nebulosa maculataque.

Rumpf mus. 1. 34. f. E.

Seb. mus. 3. t. 46. f. 20.

Martin. Conch. 2. t. 57. f. 640.

b) testa spadiceo reticulata nebulosaque, fascia interdum alba.

Rumpf mus. 1. 34. f. F. Proarchihalassius.

Argenz. zoonorph. 1. 10. f. K. L. V.

Seb. mus. 3. t. 48. f. 11. 12. 20. 23.

Knorr Vergu. 5. t. 24. f. 4.

Martin. Conch. 2. t. 57. f. 638. 639.

c) testa

- c) testa alba fusco maculata, guttata, nebulosa punctata.
List. Conch. t. 759. f. 4. et t. 777. f. 24.
Gualt. test. t. 21. f. L.
Knorr Vergn. 6. t. 13. f. 5.
Mart. Conch. 2. t. 61. f. 678.
- d) testa alba, fasciis aurantiis lineatis.
Argenv. zoom. t. 10. f. G.
Sch. mus. 3. t. 44. f. 6.
Mart. Conch. 2. t. 53. f. 590.
- e) *Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1297.*
- f) fasciis regularibus.
- anglicus. a) fasciis unica, a) cingulis pluribus punctatis albis, testa rubra,
 spira fusco maculata.
Gualt. test. t. 20. f. P.
Knorr Vergn. 5. t. 17. f. 5. et t. 24. f. 2.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 680.
- corona-
tus. b) cingulo punctorum rubellorum, lineisque transversis elevatis
Argenv. zoomorph. t. 10. f. M.
Martin. Conch. 2. p. 275. vign. 26. p. 214. f. I.
- c) fasciis flava media, cingulisque punctatis pluribus.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. N.
Martin. Conch. 2. vign. 26. p. 214. f. 2.
- d) testa fusca, fasciis alba, serieque macularum albarum obliqua.
Knorr Vergn. 5. t. 25. f. 3.
- regius. a) fasciis duabus: a) fasciis aurantiis obscurius lineatis: interstitiis albis, punctis maculisque undulatis aurantiis.
Seb. mus. 3. t. 46. f. 22. 23.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 677.
- b) fasciis albo fuscoque variis, testa alba: maculis undatis fuscis.
Martin. Conch. 2. t. 62. f. 684.
- c) fasciis flavicantibus trifariam fusco lineatis, testa alba fusco striata.
Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 3.
- d) fasciis fuscis granulato striatis, testa albo fuscoque nebulosa.
Martin. Naturgesch. 1. p. 378. t. 19. f. 12.
- Hhh hhh hhh h 5 c) fas-

Coni paucissimi europaei, multi parum, si patriam nativamque formam species, noti, et, si non nullo alio genere, in hoc certe, difficilimum, ex iconibus et in musæis asserenti, necminibus certo determinare, quid species sit, quid varietas, quam-tum arti, revornando exemplo debeatur: Ammiralium 10 et varietates nitidas, turbinis scabris et obscure Mallei aemulas nobilitavit docta ignorantia, praeterea, quomodo possintur opes, stultitia, emittavit barbara luxuria.

- ordinarius. e) fasciis tribus.
 a) testa testacea albo maculata, fasciis albis subreticulatis: media cingulo articulado.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 1.
Rumpf mus. t. 34. f. C. Admiral.
- guineensis. b) testa straminea: fascia media lineis angulatis aurorae modotinctis picta.
*Argenv. zoomorph. t. 10. f. Q**
Chemn. Conch. 10. t. 144. A. f. i. k.
- surinamensis. c) testa badia, fasciis maculatis: infima fusco alboque punctata, cingulis punctato articulatibus pluribus.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. R.
Martin. Conch. 2. p. 282. vign. 26. p. 214. f. 5.
 †) *Chemn. Conch. 10. t. 139. f. 1293.*
- d) testa fusca: maculis cordatis albis, fasciis albis: media maculis duabus quadratis.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 1.
- summus. d) fasciis quatuor.
 a) testa ferruginea maculis albis sparsis: fasciis flavis tenuissime reticulatis: tertia cingulo albo maculato.
Rumpf mus. t. 34. f. B. Opper admiral.
Argenv. Conch. t. 12. f. N. Archithalassius primus.
Petiv. gazoph. t. 28. f. 4. (male).
amb. t. 15. f. 18.
Seb. mus. 3. t. 48. f. 5. 6.
Knorr delict. t. B. V. f. 6.
Vergn. 1. t. 8. f. 2.
Regenf. Conch. 2. t. 1. f. 1.
Favann. Conch. t. 17. f. 1^a.
Spengl. seit. Conch. t. 1. f. E.
v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 7. f. 11.
Martin. Conch. 2. t. 57. f. 634.
Chemn. Conch. 10. t. 141. f. 1308.
 ††) *Chemn. Couch. 10. t. 141. f. 1309.*
- occidentalis. b) testa testacea albo maculata: fasciis flavis reticulatis, cingulo articulado.
 c) fasciis quinque et pluribus.
Argenv. zoom. t. 10. f. O. P.
Seba mus. 3. t. 48. f. 4.
Martin. Conch. 2. t. 57. f. 635.
- Cedo nulli. δ) cingulis punctato-articulatis.
 li. a) testa flava rubro picta, cingulis laevibus II.
Argenv. zoom. t. 10. f. H.
Seb. mus. 3. t. 48. f. 8.

Knorr Vergn. 6. t. 1. f. 1.
Martini Conch. 2. t. 57. f. 633.

b) testa aurantia lineis elevatis interruptis spadiceis confertis.

Spengl. Besch. berl. Naturf. 1. t. 9. f. 6.

Chemn. Conch. 10. t. 141. f. 1306.

Habitat in Oceano, Americam australem alluente, varietate fere infinita, pretiosus.

Vicarius. 11. C. testa testacea albo maculata: fasciis quatuor flavis im-
 maculatis; secunda angulo divisa.

Argenv. Conch. t. 12. f. H. Archithalassus secundus.

Rumpf mus. t. 34. f. D.

Petiv. amb. t. 15. f. 11.

Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 1.

Favann. Conch. t. 17. f. 15.

Chemn. Conch. 10. t. 141. f. 1307.

Habitat - - -

Senator. 12. C. testa conica laevi glabra: spirae anfractibus obtusis scriptis.

List. Conch. t. 784. f. 31?

Valent. Abb. t. 6. f. 50?

Martin. Conch. 2. t. 59. f. 659.

Habitat - - - *testa flava albo maculata striisque trans-*
versis albo-fuscoque articulatis numerosissimis notata.

nobilis. 13. C. testa subcylindrica laevi glabra. *Mus. Lud. Ulr.* 554.
 n. 158.*

Argenv. Conch. t. 12. f. M? Tigris lutea.

Valent. Abb. t. 3. f. 21.

Seb. mus. 3. t. 43. f. 13? 14?

Martin. Conch. 2. t. 62. f. 689.

Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 36. t. 1. f. 4.

Favann. Conch. t. 14. f. E².

Chemn. Conch. 10. t. 141. f. 1312.

β) *Chemn. Conch.* 10. t. 141. f. 1313. 1314.

Habitat - - - *testa nitidissima flava, aut fusca, ali-*
quando in olivaceum vergente, albo maculata, striis trans-
versis obsolete subtiliter punctatis.

genua- 14. C. cingulis linearibus albo fuscoque articulatis. *Mus. Lud.*
 nus. *Ulr.* 554. n. 159.

Rumpf, mus. t. 34. f. G. Genesefche Toot.

Adans. Seneg. 1. t. 6. f. 1. Jamar.

List. Conch. t. 767. f. 16. et t. 769. f. 17. b?

Olear. mus. t. 32. f. 3.

- Bonnann. recr.* 3. f. 337.
mus. Kircher. 3. f. 336.
Gualt. test. t. 22. f. G. H.
Argenv. Conch. t. 12. f. Q.
Seb. mus. 3. t. 48. f. 1-3.
Knorr Vergn. 3. t. 1. f. 1.
Martin. Conch. 2. t. 56. f. 624. 625.
- Papilio.** β) *Argenv. Conch.* t. 12. f. V. Ala papilionis.
Martin. Conch. 2. t. 56. f. 623.
Habitat ad Guineae littora, testa rubra: fasciis alternatim fusco rubroque tessellatis.
- glaucus.** 15. C. testa basi emarginata striata: spirae inermis aufractibus contiguis. *Mus. Lud. Ulr.* 555. n. 160.*
Rumpf mus. t. 33. f. GG. Boterweg van Boer.
Bonnann. recr. et mus. Kircher. 3. f. 128.
Valent. Abb. t. 9. f. 84.
Gualt. test. t. 22. f. F.
Seb. mus. 3. t. 45. f. 6. t. 55. f. 10. et tres inter 20. et tres inter 23.
Mus. Gottwald. t. 14. f. 101. c. x. c. H. c. o. d. ⊙. d. x. et f. 103.
Knorr Vergn. 1. t. 17. f. 4. et 2. t. 7. f. 1.
Mart. Conch. 2. t. 61. f. 670-674.
Chemn. Conch. 10. t. 138. f. 1277. 1278.
Habitat in India et Africa, testa maculis fuscis, spadiceis, rubris, ut plurimum seriatim varia, spira transversim striata, nunc magis nunc minus convexa, maculis interdum quadratis, rarius virgatis varia.
- Monachus.** 16. C. testa gibba fusco-caerulescente nebulata acuta basi striata. *Mus. Lud. Ulr.* 555. n. 161.*
Rumpf mus. t. 33. f. CC. Capucinus f. Anicula.
Lisb. Conch. t. 756. f. 8.
Gualt. test. t. 25. f. M?
Seb. mus. 3. t. 47. f. 27. et t. 48. f. 46. 47.
Knorr Vergn. 3. t. 27. f. 2.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 612. a-d.
 β) *Chemn. Conch.* 10. t. 142. f. 1319. 1320.
Habitat in India? testa nonnunquam seriatim punctata.
- minimus.** 17. C. testa cinerascete punctis oblongis cincta. *Mus. Lud. Ulr.* 556. n. 162.*
Knorr Vergn. 5. t. 25. f. 5. et 6. t. 1. f. 5.

VERMES TESTACEA. *Conus.*

115

Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 2.

Martin. Conch. 2. t. 56. f. 617.

β) Chemn. Conch. 10. t. 144. A. f. q. r.

Habitat in India, testa minore, interdum rubella, maculis parallelogrammis nonnunquam spadiceis.

Stercus
musca-
rum.

23. C. testa basi emarginata striata: spira anfractibus canaliculata, Mus. Lud. Ultr. 559 n. 168.*

Rumpf mus. t. 33. f. Z. Voluta arcuata.

List. Conch. t. 757. f. 9.

Boiss. mus. Kirch. 3. f. 408.

Gualt. test. t. 25. f. N. O.

Argen. Conch. t. 13. f. E.

Petiv. gazoph. t. 75. f. 1.

Seb. mus. 3. t. 55. f. 1.

Knorr delic. t. B. V. f. 7.

Vergn. 1. t. 7. f. 5. et 6. t. 16. f. 4.

Mus. Gottwald. t. 12. f. 88. a. b. c.

Regenf. Conch. 1. t. 7. f. 2.

Martin. Conch. 2. t. 64. f. 711-713.

β) Rumpf mus. t. 33. f. 2?

Seb. mus. 3. t. 55. f. 23?

Martin. Conch. 2. t. 63. f. 698. 698. a?

γ) List. Conch. t. 761. f. 10.

Rumpf mus. t. 33. f. AA.

Gualt. test. t. 25. f. P.

v. Bonn mus. Caes. Vind. test. t. 7. f. 12.

Martin. Conch. 2. t. 63. f. 696. 697.

δ) Chemn. Conch. 10. t. 139. f. 1294?

ε) Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1295?

Habitat in Asia, testa longa, angusta alba punctis nigris aut rubris sparsis, interdum glomeratis, variis in fascias aggregatis, anfractibus obtusis, in β) et γ) coronatis.

urius.

24. C. testa elongata muricata: spira coronata acuta. Mus.

Lud. Ultr. 559. n. 169.*

List. Conch. t. 775. f. 21.

Boiss. recr. et mus. Kircher. 3. f. 129.

Rumpf mus. t. 34. f. L.

Gualt. test. t. 20. f. F.

Argen. Conch. t. 12. f. R.

Zoömorph. t. 10. f. X.

Seb. mus. 3. t. 44. f. 19-22. et t. 48. f. 14-17. 24. 25.

Knorr Vergn. 1. t. 8. f. 4. et t. 24. f. 5.

Regenf.

Martin. Conch. 2. t. 55. f. 613.

Habitat - - -

Ruficus. 18. C. testa ovata basi rugosa muricatoque scabra: spira conico-convexa. *Mus. Lud. Utr.* 556. n. 163.*

α) fascia nulla.

Rumpf mus. t. 32. f. R. *Voluta cinerea.*

Seb. mus. 3. t. 43. f. 32?

Gualt. test. t. 25. f. R.

Martin. Conch. 2. t. 52. f. 578.

β) fascia albido nebulata.

Gualt. test. t. 25. f. E.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 37-39.

Argenv. Conch. t. 12. f. D.

Knorr Vergn. 4. t. 13. f. 3.

Mus. Gottwald. t. 12. f. 86. b?

Martin. Conch. 2. t. 63. f. 694. 695.

γ) *Chemn. Conch.* 10. t. 144. A. f. c. f?

Habitat in Africa, testa livida: β) lineis punctisque nigricantibus varia.

Mercator. 19. C. testa ovata alba: fasciis reticulatis flavis. *Mus. Lud. Utr.* 557. n. 164.*

Adanf. Seneg. 1. t. 6. f. 3. *Tilin.*

List. Conch. t. 788. f. 41.

Bonann. recr. et mus. Kirch. 3. f. 136.

Valent. Abb. t. 7. f. 65. B.

Argenv. Conch. t. 12. f. P.

Seb. mus. 3. t. 54.

Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 4.

Mus. Gottwald. t. 12. f. 92. a.

Martin. Conch. 2. t. 56. f. 619. 620. 621?

Habitat ad Africae littus occidentale; testa mediae magnitudinis interdum flavicante: fasciis nonnunquam fuscis aut spadiceis.

betulinus 20. C. testa basi submarginata rugosa: spira planiuscula mucronata. *Mus. Lud. Utr.* 557. n. 165.*

List. Conch. t. 762. f. 11.

Bonann. recr. et mus. Kirch. 3. f. 131.

Rumpf mus. t. 31. f. C.

Gualt. test. t. 21. f. B.

Seb. mus. 3. t. 44. f. 1-4. et t. 45. f. 7. 10. 11.

Mus. Gottwald. t. 13. f. 101. a. b.

Knorr Vergn. 2. t. 11. f. 3.

Martin. Conch. 2. t. 60. f. 665.

Medusa. β) Martin. Conch. 2. t. 61. f. 675?

γ) Knorr Delic. 1. t. B. III. f. 5?

Chemn. Conch. 10. t. 142. f. 1321.

Habitat in India, testa satis magna, flava, usplurimum ochroleuca, fasciis tessellatim maculatis lineisque intermediis fuscis aut lutescentibus varia; in β) alb. sericibus tribus characterum violaceorum, in γ) alba fasciis, maculis punctisque fuscis varia.

figulinus. 21. C. testa basi subemarginata rugosa: spira acuminata, anfractibus planiuteulis. Mus. Lud. Ulr. 558. n. 166.*

Rumpf mus. t. 31. f. V. et t. 33. f. I. Voluta filola.

List. Conch. t. 785. f. 32.

Valent. Abb. t. 4. f. 34.

Gualt. test. t. 20. f. E.

Argenv. Conch. t. 12. f. A.

Seb. mus. 3. t. 54. f. 1-4. 8.

Mus. Gottwald. t. 13. f. 98. a-f.

Knorr Vergn. 3. t. 11. f. 2. et 5. t. 25. f. 2.

Regenf. Couch. 1. t. 10. f. 47.

Martin. Conch. 2. t. 59. f. 656-658.

β) Knorr Vergn. 6. t. 15. f. 2?

γ) Chemn. Conch. 10. p. 27. t. 138. f. 1285.

Habitat paulo rarior in India, testa ad 3 pollices longa, fusca, ferruginea, flava, rarius olivacea, lineis et spira obscurioribus, intus utplurimum alba, fasciis interdum 1-2 flava, vel alba; in β) testis magis elongata, avarantia lineis obscurioribus fasciisque duabus flavicantibus varia, spira rubella nigro maculata.

ebraeus. 22. C. testa ovata alba: fasciis nigris ex maculis transversis.

Mus. Lud. Ulr. 558. n. 167.*

Rumpf mus. t. 33. f. BB. Musica rusticorum.

Argenv. Conch. t. 12. f. G. Hebraica.

Adans. Seneg. 1. t. 6. f. 5. Coupet.

List. Conch. t. 779. f. 25.

Bonann. recr. et mus. Kirch. 3. f. 122.

Gualt. test. t. 25. f. T.

Valent. Abb. t. 11. f. 94.

Petiv. gaz. 99. f. 12.

Seb. mus. 3. t. 47. f. 28. 29.

Mus. Gottwald. t. 14. f. 101. e. f. 104. c. d.

- Regenf. Conch.* 1. t. 7. f. 9. 10.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 679. et t. 62. f. 682.
 β) *Seb. musf.* 3. t. 48. f. 26-28.
Favann. Conch. t. 16. f. E³.
Chemn. Conch. 10. t. 138. f. 1284.
Habitat in Oceano indico, testis alba, fusco, spadiceo luteo-ve nebulosa: striis granulatis per totam superficiem decurrentibus.
- achati- 25. C. testa elongata subtiliter transversim striata varie nebulosa
 nus. albo punctata: spira brevi fusco maculata; apice rubro.
Seb. musf. 3. t. 44. f. 30.
Musf. Gottwald. t. 12. f. 89. b. 90.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 579. 580.
 β) *Seb. musf.* 3. t. 44. f. 29.
 γ) *Chemn. Conch.* 10. t. 140. f. 1296?
 δ) *Chemn. Conch.* t. 142. f. 1317.
Habitat in Oceano americano.
- radiatus. 26. C. testa radiis fasciisque albis.
Valent. Abh. t. 6. f. 51.
Martin. Conch. 2. t. 53. f. 584.
Habitat - - - testis fusca, lutea aut cinerea.
- leoninus. 27. C. testa luteo vel spadiceo maculata: fasciis saepius trans-
 versis albis luteisve ex granis aut maculis.
List. Conch. t. 772. f. 18. et t. 777. f. 23.
Rumpf musf. t. 34. f. M.

Valent.

Coronatae testae vocantur, quarum anfractus superne tantum notantur tuberculis f. mucronibus; inter testas coronatas et calvas nulla datur differentia specialis. An ad conos referendae cochleae a Listero t. 776. f. 22. et t. 778. f. 24. b. a Bonanni *musf. Kirch.* 3. f. 391. ab Argenville *zoozomorph.* t. 11. f. D. et in *musf. Gottwald.* t. 12. f. 85. II. III. f. 87. f. 89. a. t. 13. f. 97. b. c. f. 100. b. f. 101. e. x. et f. 102. delineatae? An distinctae species, et si, cuiusmodi tribui inferendae quas Listerus *Conch.* t. 743. f. 39. t. 765. f. 14. t. 768. f. 17. a. t. 771. f. 17. d. t. 778. f. 24. a. t. 782. f. 29. t. 785. f. 33. t. 786. f. 36. et 37. t. 789. f. 42. et t. 790. f. 43. Bonanni *recr. et musf. Kircher.* 3. f. 124. 125. a. b. f. 127. 137. *recr.* 3. f. 318. *musf. Kirch.* 3. f. 314. t. 407. *Rumpf musf.* t. 33. f. DD. *Guait. test.* t. 20. f. C. D. t. 21. f. A. C. I. Q. t. 22. f. E. L. t. 25. f. D. G. et t. 26. f. A. ab Argenville *Conch.* t. 12. f. I. S. *Seb. musf.* 3. t. 42. f. 12. 13. t. 43. f. 15. 16. 17. 18. 19. 23. 24. 33. 34. 35. t. 44. f. 16. 17. 23. 26. t. 47. f. 5. 6. 7. 26. t. 48. f. 913. 13. 19. 21. 29. (32. 34. 37. 38.) (31. 35. 36. 39. 40. 43.) 41. 44. 42. 45. 54. f. 5. 6. 9. 10. t. 55. f. 11. *Knorr Vergn.* 2. t. 1. f. 6. t. 5. f. 3. 3. t. 1. f. 2. t. 17. f. 5. 5. t. 24. f. 3. 6. t. 1. f. 5. *Musf. Gottwald.* t. 12. f. 86. et t. 123. f. 100. a. delineatas sistunt?

Valent. Abb. t. 6. f. 48.

Bonann. recr. 3. f. 130. 364.

mus. Kircher. 3. f. 130. 358.

Gualt. test. t. 21. f. N.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 10. 11. 22. et t. 44. f. 13-15.

Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 37.

Martin. Conch. 2. t. 55. f. 603, 604. 606. 607.

β) Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 4. et 5. t. 22. f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 11. f. 54. 55.

Martin. Conch. 2. t. 55. f. 605.

γ) Martin. Conch. 2. t. 55. f. 608.

δ) Martin. Conch. 2. t. 55. f. 609-111.

ε) Seb. mus. 3. t. 43. f. 29. 30.

ζ) Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 7.

η) Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 6.

θ) Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 5?

ι) Knorr Vergn. 6. t. 1. f. 3?

κ) Knorr Vergn. 6. t. 1. f. 4.

λ) Gualt. test. t. 21. f. D.

Favann. Conch. 2. t. 14. f. C^r.

Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 129. 9.

μ) Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 130.

Habitat in Oceano indico, spira parum acuta.

jaspideus. 28. C. testa subolivacea, punctis mult. fariis fasciaque obliqua albis;

Martin. Conch. 2. t. 55. f. 612.

β) Mus. Gottwald. t. 13. f. 97. a.

Habitat - - - testa oblonga, parva.

nebulosus. 29. C. testa fusca caeruleo nebulosa alboque maculata.

Gualt. test. t. 25. f. R.

Valent. Abb. t. 9. f. 74.

β) Bonann. recr. et mus. Kircher. 3. f. 126.

Knorr Vergn. 3. t. 16. f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 68.

Martin. Conch. 2. t. 55. f. 614.

Habitat - - - testa angusta, spiram versus convexiuscula; an varietas minimi?

oculatus. 30. C. testa conica flava: ocellis fasciaque albis, basi oblique striata.

Martin. Conch. 2. t. 56. f. 616.

Habitat - - - spira parum prominente, an hujus tribus?

- coffae. 31. C. testa brevi fusca: fasciis duabus albis; spirae propiore fusco maculata.
Martin. Conch. 2. t. 56. f. 618.
Habitat - - - testa mediae magnitudinis.
- Amadis. 32. C. testa dilute fusca: fascia lata cingulisque supra infraque articulatis; spira acuta coronata subtiliter transversim striata.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. 5.
Conch. t. 1. f. 5.
Knorr Vergn. 6. t. 5. f. 3?
Martin. Conch. 2. t. 58. f. 642. 643.
Favann. Conch. t. 15. f. M.
Chemn. Conch. 10. t. 142 f. 1322. 1323.
Habitat - - - testa nunc angustiori, nunc magis ventricosa.
- fulmineus. 33. C. spira acuta labioque spadiceo maculatis, virgis spadicis per totam testam decurrentibus, basi acuta oblique striata.
Mart. Conch. 2. t. 58. f. 644.
Habitat - - - an hujus tribus?
- acachnoideus. 34. C. testa spadiceo reticulata: fasciis duabus tribusve obscurioribus, spira coronata acuta.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. T.
Knorr Vergn. 6. t. 4. f. 4.
Spengl. selt. Conch. t. 1. f. D.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 676.
β) Chemn. Conch. 10. t. 144. A. f. c. d.
Habitat pretiosus - - - an hujus tribus?
- costatus. 35. C. testa fusca: fascia alba rubello undulata, striis caulis latisque, spira nodulosa; fascia granulata.
Gualt. test. t. 20. f. O.
Habitat - - -
- Yeucocteus. 36. C. testa alba fusco nebulosa virgata et maculata: punctorum alborum et fuscorum seriebus pluribus, spira coronata.
List. Conch. t. 759. f. 4. et t. 777. f. 24.
Gualt. test. t. 21. f. L.
Knorr Vergn. 6. t. 13. f. 5.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 678.
β) Martin. Naturg. 1. p. 378. t. 19. 12.
γ) Gualt. test. t. 20. f. L?
δ) Gualt. test. t. 21. f. M?

- ε) *Seb. mus.* 3. t. 48. f. 36. 37.
Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1305.
Habitat in Oceano americano, spira ut plurimum acuta.
- citrinus.** 37. C. testa citrina lineis nigris interruptis inferne varia, spira coronata basi que albis.
Mart. Conch. 2. t. 61. f. 681.
Habitat ad Curacas.
- insularis.** 38. C. testa alba spadicée nebulosa maculata punctataque, spira acuta.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 683.
Habitat . . .
- coronatus.** 39. C. testa cingulis articulatis maculisque tessellatis alternis: spira coronata.
Gualt. test. t. 20. f. R.
Valent. Abb. t. 3. f. 24.
Bonnann. recr. et mus Kirch. 3. f. 134?
Mus. Gottwald. t. 12. f. 91. a? b? f. 92. b. f. 93. a. b. d. c.
 β) *Martin. Conch.* 2. t. 63. f. 709.
 γ) *Martin. Conch.* 2. t. 63. f. 710.
 δ) *Chemn. Conch.* 10. t. 139. f. 1286.
 ε) *Chemn. Conch.* 10. t. 139. f. 128. t. 1288.
Habitat . . . testa minuta varietate innumera, fascia saepius alba.
- punctatus.** 40. C. testa fasciis duabus lineisque pluribus punctorum ex luteo fulcorum: spira punctis lineisque luteis varia.
Knorr Verogn. 6. t. 13. f. 6.
Habitat . . . rarior.
- zeylanicus.** 41. C. testa nivea roseo fuscoque nebulosa: cingulis pluribus articulatis maculisque albo spadiceoque variis, spira acuminata.
Martin. neuest. Manigfalt. 1. p. 445. t. 2. f. 20.
Chemn. Conch. 10. t. 142. f. 1318.
Habitat . . . basi oblique sulcata.
- solidus.** 69. C. testa conica crassa: transversim striata albo fuscoque nebulosa: fascia lata spiraeque pyramidalis albis; antraxibus canaliculatis. *Chemn. Conch.* 10. p. 59. t. 141. f. 1310.
Habitat . . .

*** elongati, basi rotundata, cylindro duplo longiore, quam spira.

- Clavus. 42. C. testa striis convexis laevibus: basi caerulefcente.
List. Conch. t. 744. f. 34.
Knorr Vergn. 5. t. 11. f. 5.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 570.
 β) *Chemn. Conch. 10. t. 143. f. 1327.*
Habitat rarissimus in mari indico, test. magna, longa, flavo, maculis albis, majoribus sp. caeruleo marginatis reticulata: fasciis 2 saturatioribus alio maculatis, sicut maculata sensim in mucronem obtusum desinunt.
- Nussatella. 43. C. testa subcylindrica rubra inermi striis tuberculatis scabra.
Rumpf mus. t. 33. f. EE. Terebellum granulatum.
Gualt. test. t. 25. f. L.
Argenz. Conch. t. 13. f. P.
Mus. Gotwald. t. 13. f. 96. a. b. c. et t. 43. f. 52. a.
Knorr Vergn. 2. t. 4. f. 7.
Martin. Conch. 2. t. 51. f. 567.
 β) *Chemn. Conch. 10. t. 143. f. 1329.*
Habitat rarior ad Asiae insulam Nussatello, testa pallida rubro nebulosa maculatoque, rarius tota alba, granulis striarum transversarum ex luteo fuscis, spira in mucronem obtusum abeunte.
- Terebellum. 44. C. testa alba caeruleo obumbrata subcylindrica annulato-striata: fasciis flavis.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 577.
 β) *List. Conch. t. 745. f. 36.*
Chemn. Conch. 10. t. 143. f. 1330.
 γ) *Chemn. Conch. 10. t. 143. f. 1331. n. 1.*
Habitat in mari indico.
- Fusus. 45. C. testa fusiformi alba transversim striata.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 576.
 β) *Gualt. test. t. 22. f. 2.*
Habitat - - - testa β) punctorum fuscorum ordinibus varia.
- coccineus. 46. C. testa rubra: lineis transversis nigro punctatis, fascia spiraeque albis sanguineo maculatis.
Knorr Vergn. 5. t. 24. f. 2.
Habitat - - - β) fasciis 2, cingulisque pluribus articulatis albis.

- luteus.** 47. C. testa subcylindrica annulato costata rubra obscurius nebulosa albo fasciata: spira maculata.
List. Conch. t. 760. f. 5.
Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 5.
Habitat - - - an ad granulatum spectat?
- ochroleucus.** 48. C. testa subcylindrica flava: fascia prope basin oblique striatam alba, spira acuminata virgatum maculata.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 573.
β) Seb. mus. 3. t. 44. f. 12.
Habitat - - - testa in β) flavo spadicesque maculata: striis rubro punctatis decussantibus varia.
- luteus.** 49. C. testa rufa maculis striisque transversis fulvis varia: spira flavo maculata, basi oblique striata.
Valent. Abb. t. 8. f. 70.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 572.
Habitat - - -
- affinis.** 50. C. testa ex caerulecente alba: fasciis quatuor fulvescente lineatis; punctis liturisque obscure purpureis intermediis.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 571.
β) Valent. Abb. t. 2. f. 11. p. 1. 10.
Habitat - - - arausiaca affinis, spira maculata: maculis in β) virgatis.
- violaceus.** 51. C. testa alba violaceo nebuloza: fasciis violaceis, radiis dilute fuscis.
Martin. newest. Manigf. I. p. 444. t. 2. f. 18. 19.
Habitat - - - spira pyramidalis anfractuum 6.
- granulatus.** 52. C. testa scabra inermis striis fulcatis laevibus. *Mus. Ludw. Ulr. 560. n. 170.**
Rumpf mus. t. 32. f. T. Volvata granulata.
Qual. test. t. 25. f. H.
Pet. aquat. t. 15. f. I.
Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 5.
List. Conch. t. 763. f. 12? t. 760. f. 1.
Martin. Conch. 2. t. 57. f. 63? t. 52. f. 574. 575-
β) Seb. mus. 3. t. 48. f. 26.
Habitat in Oceano africano, testa lactius rubra et magis sulcata, quam congeneris n: fasciis albis, striarumque punctis purpureis.

- polyzo-
nias. 53. C. testa intus alba, extrinsecus ex fusco lutea lineis granu-
lorum subtilissimis atpera, fascia ad spiram alba, inferius
denticulata, altera ad basin dilutius tineta pluribusque fili-
formibus.
v. *Born mus. Caes. Vindob. test. t. 7. f. 13.*
Habitat - - - spira complanata: virgis spadiceis varia,
 basi exterius obscura, intus violacea; an hujus tribus?
- bifascia-
tus. 54. C. testa alba lineis angulatis spadiceis fasciisque duabus au-
rantis varia: spira prominula, basi lineis aurantiis cincta:
maculis tessellatis internediis.
v. *Born mus. Caes. Vind. test. t. 7. f. 10.*
Habitat - - -
- niveus. 55. C. testa conica nivea: spira prominula coronata, apertura
ampla.
v. *Born mus. Caes. Vind. test. t. 7. f. 9.*
Habitat - - - an hujus tribus?
- arausia-
cus. 56. C. testa incornata laevi: fasciis albidis, anfractuum summis.
canaliculatis.
Rumpf mus. t. 34. f. A. Oranjen Admiraal.
Valent. Abb. t. 12. f. 100.
Pet. amb. t. 7. f. 7.
Agenc. zoomorph. t. 10. f. I.
Sch. mus. 3. t. 48. f. 7.
Knorr Vergn. 1. t. 8. f. 3. et 5. t. 24. f. I.
Speng. selt. Conch. t. 2. f. E.
Martin. Conch. 2. t. 57. f. 636. 637.
ß) *Chemn. Conch. 10. t. 144. A. f. 1.*
Habitat rarus in India, testa alba; fasciis 2-3 aurantiis li-
nei que albis: maculis tessellatis pulvis, spira maculis ob-
longis rubris, albis fuscisque varia.
- Magus. 57. C. testa subcylindrica: fasciis longitudinalibus albo-pun-
ctatis. *Mus. Lud. Ulr. 560. n. 171.**
Rumpf mus. t. 32. f. Q. Voivta maculosa.
Bonann. recr. 3. f. 362?
mus. Kirch. 3. f. 355.
Gualt. test. t. 20. f. F?
Agenc. zoomorph. t. 11. f. C.
Sch. mus. 3. t. 44. f. 27.
Knorr Vergn. 6. t. 16. f. 5? et t. I. f. 3.
Martin. Conch. 2. t. 58. f. 641.

Habitat in India, testa alba, lineis punctatis maculisque oblongis spadiceis luteis, flavis, fuscis varia, spira acuta maculata.

- 58. C.** testa ovato-oblonga gibba nebulosa: striis tenuissimis parallelis fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 561. p. 172.
Rumpf mus. t. 31. f. F. *Voluta tigrina.*
Adans. Seneg. 1. t. 6. f. 2. *Melar.*
List. Conch. t. 755. f. 7. et t. 760. f. 6.
Gualt. test. t. 26. f. D.
Valent. Abh. t. 7. f. 60. 61.
Pet. gaz. t. 98. f. 9.
Argenv. Conch. t. 13. f. C.
Seb. mus. 3. t. 42. f. 5-9. et t. 47. f. 22. 23.
Mus. Gottwald. t. 12. f. 83. a-g.
Knorr Vergn. I. t. 18. f. 1. et 3. t. 12. f. 5. t. 21. f. 1. et t. 22. f. 4.
Regenf. Conch. I. t. 8. f. 13.
Martin. Conch. 2. t. 64. f. 714-716.
β) *Chemn. Conch. 10. t.* 141. f. 1311.

Habitat ad Africae littus occidentale frequens, testa ad 4 pollices longa, nivea, striis interdum rubellis aut flavescens, basi emarginata, transverse striata.

- Textile. 59. C.** testa venis reticulatis luteis: maculis luteis fuscisque.
Mus. Lud. Ulr. 561. n. 173.*
Argenv. Conch. t. 13. f. F. I. *Pannus aureus.*
Adans. Seneg. 1. t. 6. f. 7. *Loman.*
List. Conch. t. 788. f. 40.
Bonann. recr. et mus. Kirch. 3. f. 135.
Rumpf mus. t. 32. f. O. P.
Gualt. test. t. 25. f. I. AA.
Seb. mus. 3. t. 43. f. 6-12. et t. 47. f. 13-17.
Olear. mus. t. 31. f. I. 3.
Mus. Gottwald. t. 13. f. 85. a. b. c. f. 94. a. b. d-h. et f. 95. a. β.
Knorr Vergn. I. t. 18. f. 6. et 2. t. 8. f. 3.
Regenf. Conch. I. t. 6. f. 62.
Martin. Conch. 2. t. 54. f. 598-600.
Martin. Conch. 2. t. 54. f. 602.
Chemn. Besch. berl. naturf. Ges. 3. t. 8. f. A.
Conch. 10. t. 143. f. 1324-1325.
β) *Chemn. Conch. 10. t.* 143. f. 1326. a.
γ) *Chemn. Conch. 10. t.* 143. f. 1326. b. c.

Habitat ad Bandam Asiae, testa alba, in γ) perfici florum colore tincta, fasciis tribus aurantiis, in β) fasciis 2 obscurioribus varia.

aulicus. 60. C. testa venis reticulatis fasciisque longitudinalibus fuscis interruptis. *Mus Lud. Vir. 562. n. 174.**

Argenv. Conch. t. 13. f. D. G. Nigella.

Bonann. recr. et mus. Kirch. 3. f. 133.

Rumpf mus. t. 33. f. 3. 4.

Valent. Abb. t. 9. f. 75.

Gault. test. t. 25. f. V. X 7.

Seb. mus. 3. t. 43. f. 1-5. et t. 47. f. 10-12.

Olear. mus. t. 31. f. 4. 5.

Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 1-3. et 3. t. 19. f. 1.

Regenf. Conch. 1. t. 8. f. 25.

v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 7. f. 14.

Favann. Conch. 2. t. 18. f. C⁶. C⁷.

Chemn. Conch. 10. t. 143. f. 1328.

a) Mart. Conch. 2. t. 53. f. 591. 593. 594.

β) Mart. Conch. 2. t. 53. f. 592. 595. t. 54. f. 596.

γ) Mart. Conch. 2. t. 54. f. 597.

δ) testa ex luteo fusca: maculis reticulatis cordatis perpendicularibus.

e) Mart. Conch. 2. t. 54. f. 601.

Seb. mus. 3. t. 47. f. 3?

§) Knorr Vergn. 3. t. 18. f. 2.

Habitat in Asia, an specie distinctus a textill.

Thomae. 70. C. testa laevi alba characteribus punctisque seriatis badiis, cingulis tribus maculisque albis varia apice rubicunda, spira conica: anfractibus canaliculatis.

Mart. Conch. 2. t. 53. f. 590.

Chemn. Conch. 10. t. 143. f. 1331. n. 2.

β) Chemn. Conch. 10. t. 138. f. 1282. 1283.

Habitat in mari indico.

**** *testa medio vent. testa, atrinque angustata.*

finensis. 61. C. testa medio ventricosa flava: ocellis albis, basi transversim striata.

Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 66.

Mart. Conch. 2. t. 56. f. 615.

Habitat - - -

***** *Laxi ventricosi in dorsum dissecti super manus
tinnitantes.*

Spectrum. 62. C. testa caerulecente flava nebulosa: punctis striisque albo-
luteis. *Mus. Lud. Ulr.* 562. n. 175.*

Rumpf mus. t. 32 f. S. *Voluta spectrorum.*

List. Conch. t. 783. f. 30.

Valent. Abb. t. 5. f. 39.

Gualt. test. t. 25. f. S.

Seb. mus. 3. t. 47. f. 24.

Mus. Gottwald. t. 14. f. 101. f? t. 12. f. 84. a-d. et f. 85. a. d.

Knorr Vergn. 2. t. 3. f. 4.

Martin. Conch. 2. t. 5. f. 581-583.

β) *Chemn. Conch.* 10. t. 140. f. 1304.

γ) *Chemn. Conch.* 10. t. 144. A. f. g. h.

δ) *Chemn. Conch.* 10. t. 144. A. f. o. p.

ε) *Chemn. Cab. Rudolft.* p. 79 n. 18. t. 6. f. 2?

Habitat in Oceano Aëae australi rarior, spira satis acuta.

bullatus. 63. C. testa flava albo nebulosa. *Mus. Lud. Ulr.* 563. n. 176.*

Adans. Seneg. 1. t. 5. f. 1. *Potan.*

List. Conch. t. 741. f. 37. t. 742. f. 38. t. 748. f. 42-43. et
t. 749. f. 44-45.

Gualt. test. t. 26. f. C.

Argenv. Conch. t. 13. f. H.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 14. 15. et t. 43. f. 15. 16.

Mus. Gottwald. t. 10. f. 65. a-f. et t. 66. a. b.

Knorr Vergn. 5. t. 8. f. 2. 3. et t. 11. f. 4.

Regensf. Conch. 2. t. 11. f. 45.

Favann. Conch. 2. t. 18. f. C².

Martini Conch. 2. t. 65. f. 725-732.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. f. 1.

n. *Litterat.* 3. p. 245. t. I. f. 10. II.

Chemn. Conch. 10. t. 142. f. 1315. 1316.

*Habitat - - - testis tenui, nunc unicolore, frequentius
maculata, nebulosa, fasciata, nunc magis nunc minus
centricosa, apertura ut plurimum ampla, caerulecente, spi-
ra nunc plana, nunc acuta.*

Tulipa. 64. C. testa oblonga gibba laevi: apertura deliscente.

Argenv. Conch. t. 13. f. B. *Tulipa.*

List. Conch. t. 764. f. 13.

Bonnann. mus. Kircher 3. f. 4II.

Rumpf mus. t. 34. f. K.

Valent. Abb. t. 10. f. 89.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 16-21. t. 43. f. 20. 21. 22. 36?

Knorr Vergn. 3. t. 11. f. 4. et 5. t. 20. f. 1. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 2. f. 20.

Martini Conch. 2. t. 64. 65. f. 718-721.

Habitat in India, Africa et meridionali America, geographice affinis, at testa non coronata, alba hinc inde caerulescenti fusco, luteo rubroque nebulosa, lineisque spadiceis interruptis picta, apertura caerulescente, basi obsolete oblique striata, spira acuta, laevi, maculata, subtilissime transversim striata.

Geographus. 65. C. testa oblonga gibba coronata, apertura dehiscente.

Rumpf mus. t. 31. f. G. Nubecula.

Argenv. Conch. t. 13. f. A. Textile fericum.

Klein ostr. t. 5. f. 90. Nubecula, tulipa gallorum.

Adanf. Seneg. 1. t. 6. f. 8. Salar.

Liszt. Conch. t. 747. f. 41.

Bonann. recr. et mus. Kircher. 3. f. 319.

Gualt. test. t. 26. f. E.

Pet. gaz. t. 98. f. 8.

Seb. mus. t. 42. f. 1. 4.

Knorr Vergn. 3. t. 21. f. 2. et 6. t. 17. f. 3.

Mus. Gottwald. t. 12. f. 85. I.

Martini Conch. 2. t. 64. f. 717.

Habitat rarior in Oceano indico et africano, testa subcylindrica ad basin rugosam paulo angustiore, pellucida, alba, fusco maculata nebulosaque, apertura alba, spira interdum rosea.

Nubecula. 66. C. testa alba aurantio nebulosa et maculata: punctis sparsis albis, spira prominente acuta.

Seb. mus. 3. t. 42. f. 14. 15.

Martini Conch. 2. t. 56. f. 622.

β) *Argenv. Conch.* t. 13. f. H.

Habitat - - - -

spurius. 67. C. testa alba: macularum spadicearum aut nigrarum irregularium seriebus fasciisque punctatis interruptis alternis.

Gualt. test. t. 21. f. D. F.

Argenv. Conch. t. 12. f. C.

Seb. mus. 3. t. 44. f. 24. 25. 28. et t. 46. f. 24-29.

Knorr Vergn. 3. t. 18. f. 5. et 5. t. 9. f. 6. et t. 22. f. 3.

Martin. Conch. 2. t. 56. f. 626-628.

Habitat - - - -

Vexillum. 68. C. testa fusca albo obumbrata: fascia alba interrupta.

Rumpf *mus.* t. 31 f. S. 5

Gualt. *test.* t. 20. f. M. et t. 21. f. E..

Seb. *mus.* 3. t. 44. f. 8-11. et t. 45. f. 16. 17.

Mart. *Conch.* 2. t. 57. f. 629.-

β) *Chemn. Conch.* 10. t. 144. A. f. m. n.

Habitat - - - *testa interdum satis magna, fascia nonnunquam cruciata.*

ventrico. 71. C. testa fusca albo fasciata inferne angustata caerulefcente
ius. - - - obumbrata laevi, spira conica exserta. *Kaemm. Cab. Ru-*

dotst. p. 91. n. 46. t. 6. f. 3. 4.

Habitat - - - -

320. CYPRAEA. *Animal* Limax.

Testa univalvis, involuta, subo-
vata, obtusa, laevis.

Apertura utrinque effusa, linearis,
utrinque dentata, longitudi-
nalis.

Exanthe. I. C. testa subturbinata ferruginea maculis pallidis rotundis ad-
ma. - - - sperta: linea longitudinali subramosa.

List. Conch. t. 698. f. 45. et t. 699. f. 46.

Bonnann. recr. 3. f. 257.

mus. Kirch. 3. f. 256.

Gualt. test. t. 16. f. O.

Pet. gaz. t. 96. f. 6.

Seb. mus. 3. t. 76. f. 4. 5. 16. 18.

Mus. Gotwald. t. 3. f. 14? et t. 14. f. a. b. c. d. e. f.

Regensf. Conch. 1. t. 6. f. 63. et t. 10. f. 38.

Martini. Conch. 1. t. 28. f. 289. t. 29. f. 298-300.

β) *List. Conch.* t. 697. f. 44.

Chemn. Conch. 10. t. 145. f. 1343.

Habitat in Oceano americano, atlantico, *mappae affinis,*
testa subtus pallida immaculata, dentibus aperturæ sus-
cis, supra oculis gutturæ pallidis, nunc majoribus, nunc
minoribus, detrita fusco fasciata aut tessellata, aut cae-
rulea.

Mappa. .2. C. testa subturbinata characteribus inscripta: linea longitu-
dinali ramosa. *Mus. Lud. Ulv.* 565. n. 179.

Rumpf