

**227. CÔNE AFRICAINE**, *Conus africanus*, NOBIS.

(Collect. de M. LARGILLIERT.)

Pl. CIV, fig. 2.

C. testâ turbinatâ, supernè inflato-obtusâ; fuscâ vel nigrâ, maculis albis sparsis, in medio fasciatis, fasciâ irregulari lineis fuscis articulatâ; spirâ obtusâ maculis albis guttatâ.

Coquille turbinée, renflée et obtuse vers sa partie supérieure. La spire est surbaissée et convexe, elle est formée de cinq tours étroits; le dernier a son angle spiral arrondi et obtus; il porte vers sa partie inférieure huit sillons obliques assez espacés entre eux. La coloration consiste en un fond d'un brun très-foncé ou noirâtre avec des points blancs épars sur la partie supérieure et des maculations également blanches, très-grandes, mais interrompues, formant, vers le milieu du dernier tour, une large fascie irrégulière articulée par des séries transverses de points bruns.

Long. 30 millim.

Habite l'océan Atlantique, la côte de Guinée.

Charmante espèce, facile à distinguer à cause de sa forme obtuse et renflée vers sa partie supérieure, mais surtout à cause de sa coloration brune très-foncée, parsemée de taches blanches.

**282. CÔNE ARDOISÉ.** *Conus ardisiaceus*, NOBIS.

(Collect. de M. LOROIS.)

Pl. CVIII, fig. 1.

C. testâ oblongo-turbinatâ, subventricosâ; cinereoque nigro maculatâ, maculis irregularibus magnis, lineis transversis punctorum nigrorum articulatis; spirâ obtusâ; ultimo anfractu, supernè obtuso.

Coquille oblongue, turbinée, renflée vers sa partie supérieure. La spire est convexe, obtuse, mucronée au sommet; on y compte six ou sept tours étroits;

GENRE CÔNE.

317

l'angle spiral du dernier est obtus; ce tour est lisse, excepté vers sa base qui porte quelques sillons obliques. L'ouverture est sinueuse, un peu dilatée vers sa partie inférieure. La coquille est marbrée de grandes maculations noirâtres irrégulières, se détachant sur un fond gris cendré nuageux; en outre, elle est traversée par un grand nombre de lignes ponctuées, comme articulées. L'intérieur de l'ouverture est d'un brun violacé.

Long. 35 millim.

Habite

Cette espèce est si voisine du *Conus cinereus*, qu'on pourrait la prendre pour une variété de celui-ci; mais, en les examinant attentivement, on reconnaît entre ces deux coquilles des caractères suffisants pour les rendre distinctes.

279. **CONE DEUIL.** *Conus ateralbus*, NOBIS.

(Collect. de M. LOROIS.)

Pl. CVIII, fig. 4-4a.

C. testâ abbreviatâ, turbinatâ, crassâ; fuscâ, maculis albis sparsis, fasciibus dispositis; spirâ depressâ, latâ; anfractibus supernè planulatis; ultimo valdè carinato, basi tenuiter striato.

Coquille épaisse, raccourcie, pyramidale, turbinée. La spire est presque plane, légèrement mucronée au sommet; on y compte six ou sept tours aplatis ou

514

GENRE CÔNE.

même canaliculés en dessus; l'angle spiral du dernier est très-marqué; sa base porte quelques sillons obliques peu prononcés. L'ouverture est étroite, un peu dilatée vers sa partie inférieure. La columelle est légèrement flexueuse, surtout vers sa base. La coquille est d'un brun foncé noirâtre avec des taches blanches irrégulières, le plus souvent de forme quadrangulaire, composant deux fascies transverses plus ou moins larges; quelquefois ces taches sont confluentes et allongées. La fascie la plus large est placée au-dessous du milieu du dernier tour; l'autre, plus étroite et interrompue, occupe l'angle spiral.

Long. 45 millim.

Habite

Espèce remarquable par sa forme raccourcie, sa spire presque blanche, ses taches fasciées blanches aussi et se détachant nettement sur le fond noirâtre. Elle a l'aspect général du *Conus nivosus*, mais elle est un peu plus épaisse, plus raccourcie et ses taches sont disposées différemment. La variété, fig. 4<sup>a</sup> est d'une couleur en général plus obscure.

73. CÔNE ACAJOU. *Conus badius*, NOBIS.

(Collect. VERREAUX.)

Pl. XXXIII, fig. 3.

C. testâ turbinatâ, albo-violaceâ, transversim striatâ; striis tenuibus, numerosis, undulatis, fulvis vel aurantiis, longitudinaliter flammulatis; spirâ plano-obtusâ, albâ, fusco-maculatâ; apice truncato; aperturâ albo-violaceâ.

Coquille ayant la figure d'un cône renversé, à spire composée de douze tours aplatis; ceux du sommet sont presque confondus ensemble et forment un bouton blanc à peine saillant; leur suture offre un sillon bien prononcé. Toute la surface de cette coquille est munie de stries transverses: celles de la spire sont plus saillantes que celles du dernier tour qui sont plus ou moins fines et très-nombreuses; elles deviennent beaucoup plus rapprochées et plus visibles à la base du tour. Ces stries sont parallèles et onduleuses. L'ouverture est blanche, nuancée de violet; son échancrure supérieure est arrondie, peu profonde: son bord droit est tranchant et liséré de fauve. Le fond de la coquille est d'un blanc violacé; les stries sont fauves ou d'un rouge orangé: elles sont traversées par des veines ou flammules longitudinales de même couleur et qui sont souvent réunies; une fascie

12

90

GENRE CÔNE.

blanche est située un peu au-dessous de la partie moyenne du dernier tour: cette fascie est rarement interrompue ou traversée par les flammules. La spire est blanche et flambée de taches d'un brun noirâtre ou d'un marron foncé.

Long. 60 millim.

Habite

Quoique voisine du *Conus capitaneus*, sous plusieurs rapports, cette espèce en est distincte par sa spire très-aplatie et d'autres caractères.



**189. CÔNE DE BERNARDI.** *Conus Bernardii*, NOBIS.

(Collect. de M. BERNARDI.)

Pl. C, fig. 2.

C. testâ turbinatâ, subcylindricâ, transversim sulcatâ; fulvâ, maculis albis sparsis vel supernè aggregatis in fascio fusco; spirâ striatâ, apice mucronatâ.

Coquille allongée, subcylindrique, à plans latéraux très-légèrement convexes, à angle spiral arrondi et obtus. La spire est conique, médiocrement élevée et mucronée au sommet. Toute la surface du dernier

GENRE CÔNE.

221

tour est traversée par des sillons distants entre eux, surtout vers sa partie inférieure. La coquille est de couleur fauve, avec des maculations irrégulières blanchâtres et peu nombreuses, si ce n'est vers l'angle spiral où elles couronnent une fascie brune qui se retrouve sur les premiers tours. En outre, la spire est chargée de stries longitudinales parallèles à l'axe de la coquille.

Long. 44 millim.

Habite

Jolie espèce bien distincte de ses congénères par sa forme élégante, par les sillons dont elle est traversée et par la fascie brune tachetée de blanc qui décore la partie supérieure de son dernier tour.

Nous nous faisons un plaisir de la dédier à M. Bernardi, bien connu par son zèle pour la conchyliologie.

**320. CÔNE DE BLAINVILLE.** *Conus Blainvillei*, NOBIS.

(Collect. de M. VERREAUX.)

Pl. CXI, fig. 1.

C. testâ abbreviato-turbinatâ, subincrassatâ; luteo-viridescente, bifasciatâ, lineis transversalibus punctorum nigrorum articulatis ornatâ; spirâ brevi, acutâ, anfractibus supernè pauciter angulatis; fauce violacèâ, albo bifasciatâ.

Coquille turbinée, raccourcie, assez épaisse. La spire conique est un peu élevée; elle est formée de sept tours étroits, lisses, subanguleux en dessus; l'angle spiral du dernier est bien marqué, mais obtus; toute sa surface est lisse, seulement la partie supérieure du canal offre quelques légères stries obliques. La coquille a une teinte générale d'un jaune verdâtre; presque toute son étendue est traversée de lignes ponctuées et comme articulées qui sont séparées en deux faisceaux par une espèce de fascie d'un jaune plus clair; cette fascie est située un peu au-dessous du milieu du dernier tour; une autre fascie, de même teinte, occupe la partie supérieure de la coquille près de l'angle spiral. L'ouverture est violacée dans l'intérieur. On distingue sur le bord droit deux traces blanches qui correspondent aux fascies externes.

Long. 58 millim.

Habite

Cette espèce a une certaine analogie avec le *Conus Reevii*, mais elle en est éminemment distincte par sa forme et sa coloration.

249. **CÔNE DE BOIVIN.** *Conus Boivini*, NOBIS.

(Collect. de M. BOIVIN.)

Pl. LXIV, fig. 2.

C. testâ turbinatâ, cylindricâ, ponderosâ, supernè inflatâ, ad basim depressiusculâ; spirâ planatâ, apice mucronato; albo-roseâ nebulatâ, obscurè fulvo-bifasciatâ, maculis rubro-fuscis sparsis ornatâ; ultimo anfractu basi et supernè crassisulcato.

Coquille épaisse, turbinée, cylindrique, légèrement renflée vers son sommet et un peu rétrécie à sa base. La spire est aplatie : le sommet seul en est saillant et mucroné. Le dernier tour offre un angle spiral anguleux et bien marqué; sa partie supérieure est ornée de huit gros sillons transverses distants les uns des autres; le milieu est très-finement strié et sa base est pourvue de huit autres sillons obliques fort gros aussi

GENRE CÔNE.

285

et espacés entre eux. La coloration de la coquille consiste en un fond d'un blanc rose nébuleux orné de deux fascies transverses de couleur fauve, sur lesquelles sont éparses des maculations très-irrégulières, d'un brun foncé et le plus souvent longitudinales; ces maculations n'occupent pas exclusivement les deux zones transverses : on en retrouve d'autres plus petites sur le reste de la coquille et particulièrement sur la spire.

Long. 62 millim.

Habite

Belle espèce rappelant par sa forme générale le *Conus striatus*, mais elle en est distincte par l'aplatissement complet de la spire et surtout par les gros sillons transverses de son dernier tour; sa coloration, et particulièrement les deux fascies qui la traversent, servent encore à la faire reconnaître.

190. CÔNE DE BRUGIÈRE. *Conus Brugieri*, NOBIS.

(Collect. de M<sup>me</sup> DUPONT.)

Pl. LVI, fig. 2.

C. testâ subcylindricâ, elongatâ, basi coarctatâ; olivaceo-fuscâ, cum lineis obscuris et punctis albis articulatâ; fasciâ angustâ superiore ultimo anfractu obscurâque albo variegatâ in parte inferiore; spirâ conicâ, maculatâ.

Coquille subcylindrique, étroite, allongée, légèrement renflée vers le milieu, très-rétrécie à sa base; elle se compose de six ou sept tours faisant légèrement saillie les uns sur les autres. Le dernier est à peine anguleux vers son sommet; il est lisse jusqu'au

222

GENRE CÔNE.

canal où quatre ou cinq sillons sont faiblement indiqués. La coquille est d'un brun olivâtre plus ou moins foncé, quelquefois presque noir, avec des lignes transverses étroites et en grand nombre, de couleur obscure et articulées de petits points blancs. Vers le tiers inférieur de la coquille on voit une fascie étroite blanchâtre sur laquelle sont disposées des taches irrégulières d'un blanc de lait, et dans leur intervalle d'autres taches de couleur fauve. L'angle supérieur du dernier tour est également pourvu d'une ligne blanchâtre ou brune plus étroite et maculée. La spire offre aussi des taches blanchâtres, mais moins afférentes. La suture est lisérée de fauve.

Long. 38 millim.

#### Habite

Espèce confondue par Brugière avec le *Conus jamaicensis*, et constituant sa variété B. Sa forme plus allongée, cylindrécée, sa spire conique ainsi que sa coloration la rendent facilement distincte. Elle a d'ailleurs assez l'aspect du *Conus mediterraneus*.

Nous dédions ce Cône au savant auquel la science est redevable d'articles si remarquables sur la conchyliologie, dans l'Encyclopédie méthodique.

**251. CÔNE DE CAILLAUD.** *Conus Caillaudi*, NOBIS.

(Collect. de M. CAILLAUD.)

Pl. LV, fig. 5.

C. testâ elongato-turbinatâ, subcylindricâ, transversim omninò sulcatâ ; luteo aurantiâ ; spirâ subplanatâ, rubro maculatâ, apice mucronato.

Coquille allongée, turbinée, subcylindrique, un peu rétrécie vers le milieu. La spire est surbaissée ; le sommet, saillant, est mucroné. On y compte six tours aplatis ; les premiers sont pourvus, près de leur suture, d'une rangée de tubercules à peine visibles ; l'angle spiral du dernier est un peu émoussé ; il porte, sur toute son étendue, des sillons transverses parallèles et un peu onduleux. Toute la coquille est d'un jaune orangé assez vif, les sillons transverses s'y détachent par leur couleur brune. La spire offre des maculations irrégulières rougeâtres.

Long. 50 millim.

Habite

Cette espèce est remarquable par sa belle couleur orangée et les sillons qui la couvrent. Elle nous a été communiquée par M. Caillaud, amateur distingué, auquel nous nous faisons un plaisir de la dédier.

(Collect. de M. BERNARDI.)

Pl. XCVII, fig. 1.

C. testâ elongato-turbinatâ, ad basim attenuatâ; albâ, punctis minimis fuscis regulariter seriatis; spirâ elatâ, acutâ, variegatâ, apice fusco.

Coquille élancée, très-atténuée vers sa partie inférieure où elle paraît comme étranglée. La spire est fort élevée, acuminée et pointue; on y compte onze ou douze tours étroits, étagés entre eux, portant un angle bien marqué sur leur partie externe. La suture est finement marquée; le dernier tour est lisse jusqu'à sa base qui offre cinq ou six gros sillons transverses. Cette coquille est blanche avec des séries transverses de petits points bruns très-régulièrement espacés entre eux. La spire est parsemée de taches brunes et obliques. Le sommet est entièrement coloré de brun.

Long. 51 millim.

Habite

Cette espèce, de forme élégante, est remarquable par les séries transverses de petits points bruns dont elle est ornée.

(Collect. de M. GUBBA.)

Pl. CIV, fig. 5.

C. testâ turbinatâ, supernè turgidâ. infrâ coarctatâ; castaneâ, maculis albis irregulariter sparsis; fasciâ obscurâ subspirali; spirâ exsertâ, mucronatâ.

Coquille turbinée, épaisse, formant un cône à base très-élargie, environ quatre fois plus large que son sommet; les plans latéraux sont très-convexes, surtout vers leur milieu, au-dessous duquel existe un rétrécissement remarquable. L'angle spiral du dernier tour est saillant, quoique obtus, et on le retrouve sur les tours précédents. La spire est très-élevée, conique, étagée; on y compte environ neuf tours obliquement aplatis en dessus. Cette coquille est d'un brun foncé ou marron, ornée d'une fascie étroite plus foncée au-dessous de l'angle spiral; elle est en outre parsemée de taches blanches irrégulières, quelquefois très-allongées, mais généralement peu nombreuses, excepté sur la spire où elles sont plus petites et en plus grande quantité.

Long. 45 millim.

Habite

Cette espèce est remarquable par sa forme très-élargie vers sa partie supérieure et rétrécie au contraire à sa base; sa couleur marron, parsemée de taches blanches, et sa spire assez élevée servent encore à la distinguer.

**252. CÔNE DE CÉCILE.** *Conus Cecilei*, Nomis.

(Collect. de M. LARGILLIERT.)

Pl. XCVIII, fig. 4, et pl. CVII, fig. 5.

*C.* testâ elongatâ, subcylindraceâ; luteo-fuscâ obscure fasciatâ, punctis minimisque numerosis nigricantibus seriatis elegantissimè ornatâ; spirâ exsertâ, contabulatâ, conico-acutâ, lineis fuscis radiatâ, basi canali nigrescente.

Coquille allongée, subcylindracée, à spire assez élevée formant environ le quart de la longueur totale; elle est conique, acuminée et pointue; on y compte neuf tours étroits aplatis en dessus et légèrement étagés; l'angle spiral du dernier est bien marqué: ce tour est lisse sur toute son étendue, excepté vers sa partie inférieure qui présente quelques sillons obliques extrêmement fins et rapprochés entre eux. La coloration de la coquille consiste en un fond d'un brun jaunâtre tout couvert de points très-fins et disposés en séries transverses fort rapprochées les unes des autres; ces points sont bruns ou noirâtres. On voit encore sur la surface une ou deux fascies transverses peu marquées, et la partie supérieure du canal est colorée de noir. La spire est couverte de petites linéoles brunes longitudinales et comme radiées.

Long. 42 millim.

Habite les mers de Chine.

Cette charmante espèce est extrêmement remarquable par sa coloration. Nous avons fait représenter, pl. 407, fig. 5, une variété de ce Cône, dont la coloration est beaucoup plus claire, les points moins apparents, les fascies transverses plus visibles, et dont la forme est plus pyramidale. Cette variété appartient à la collection de M. Gubba.



(Collect. de M. CIBIEL.)

Pl. CVII, fig. 2.

C. testâ turbinatâ, valdè conicâ, supernè latissimâ, infernè attenuatâ, striis transversis minutissimis ornatâ, ad basim sex elatioribus; viridè pictâ, fasciis fuscis bicinctâ; spirâ conico-obtusâ, spiraliter striatâ.

Coquille turbinée, très-élargie vers sa partie supérieure, atténuée et un peu rétrécie à sa base; l'angle spiral du dernier tour est bien marqué et légèrement tuberculeux; toute la surface est traversée par des stries extrêmement fines; vers la base on en distingue six plus saillantes et plus espacées entre elles. L'ouverture est étroite, les bords sont presque parallèles; le bord droit, mince et tranchant, est échancré vers son sommet. La spire est conique, très-surbaissée; on y compte six tours aplatis garnis de stries décurrentes. La suture en est bien marquée. La coloration consiste en un fond verdâtre sur les individus très-frais ou quelquefois blanchâtre et sur lequel se détachent deux larges fascies brunes vaguement indiquées. La spire est brune, avec quelques petites taches un peu plus foncées. L'ouverture est violette dans l'intérieur.

Long. 28 millim.

Habite

Petite espèce bien remarquable par sa forme élargie vers sa spire qui est couronnée d'une rangée de très-petits tubercules.

Nous devons la connaissance de cette espèce à l'obligeance de M. Cibiel, amateur au Havre.

(Collect. du Mus. et de M<sup>me</sup> DUPONT).Pl. LXIII, fig. 1, 1<sup>a</sup>.

C. testâ conică, coronată, citreă, fulvo-zonată, albo-maculată; spiră depressă, obsoletă sulcată; apertură întis roscă.

Coquille conique, peu épaisse, très-luisante sur sa superficie, marquée de quelques sillons transverses à peine visibles : ceux de la base sont plus saillants. La spire est obtuse, légèrement aplatie, composée de neuf spirales dont les sutures sont bien marquées, quoique peu profondes ; le bord de ces spirales est couronné d'un rang de petits tubercules qui tendent quelquefois à disparaître et rendent les tours subanguleux. L'ouverture est étroite, d'un blanc rosé dans l'intérieur. L'échancrure de son sommet est peu profonde. La coquille est lisse, portant, sur un fond d'un jaune citron ou nuancé d'orange, une fascie assez large placée vers le milieu du dernier tour ; cette fascie est de couleur fauve, piquetée de petits points bruns, et interrompue par de larges taches blanches dont les bords sont déchiquetés ; une seconde fascie, veinée de même couleur que la précédente, mais plus étroite, occupe le sommet du dernier tour et toute la superficie de la spire.

Long. 25 millim.

Habite l'Océan Indien.

Nous ne connaissons encore que peu d'individus de cette jolie petite espèce de Cône : l'un d'eux se trouve dans la collection du Muséum ; un autre nous a été communiqué par M<sup>me</sup> Dupont ; c'est la variété de notre même pl. 65, fig. 1<sup>a</sup> ; elle est remarquable par un fond de coloration plus orangé et par des flammules étroites, longitudinales, légèrement ondulées qui garnissent la surface de son dernier tour.

(Collect. DECLERC.)

Pl. LIX. fig. 6.

*C.* testâ turbinatâ, ventricosâ, supernè inflatâ, basi attenuatâ, angulo spirali rotundato; citrino-aurantiâ, maculis albis nebulosâque obscurè fasciatâ, lineis transversis fuscis et albis articulatis; spirâ obtusâ apice conicâ.

Coquille turbinée, ovale, ventrue, renflée vers sa partie supérieure. La spire est peu élevée, conique; la suture est profonde et bien marquée; les tours, au nombre de sept, sont légèrement convexes en dessus; le dernier, dont l'angle spiral est arrondi, est lisse jusqu'à sa base qui porte un grand nombre de stries très-fines et très-rapprochées entre elles. Toute la coquille est d'un jaune citrin assez vif avec de grandes maculations blanches, nuageuses, formant une sorte de fascie vaguement indiquée et située un peu au-dessous du milieu du dernier tour. Des maculations semblables existent également vers l'angle spiral et à la base du canal. Le dernier tour est aussi orné de lignes transverses brunes articulées de blanc, formant des fascies. La spire est garnie de taches nuageuses blanches et jaunâtres un peu plus foncées que le fond lui-même.

Long. 40 millim.

Habite la mer des Indes, les côtes de l'île de Ceylan.

Cette espèce est remarquable entre toutes celles du même genre par sa coloration orangée, ses fascies nuageuses peu arrêtées, et les lignes articulées de blanc qui la traversent.

**324. CÔNE MAILLÉ.** *Conus concatenatus*, NOBIS.

(Collect. de M. LOROIS.)

Pl. CX, fig. 4.

C. testâ turbinatâ, ovato-oblongâ, tenui; albâ, lineolis aurantiis angulatis laxè textilosis ornatâ; spirâ conicâ, subelatâ; aperturâ dilatâtâ, intûs albâ.

Coquille turbinée, mince, ovale, oblongue. Spire médiocrement élevée, conique, un peu acuminée, formée de sept tours étroits et lisses en-dessus; l'angle spiral du dernier peu marqué et obtus; il porte à sa base quelques stries obliques extrêmement fines. L'ouverture est large vers sa partie inférieure; le bord droit mince et tranchant. La coloration de la coquille consiste en un fond blanchâtre sur lequel se détache une sorte de grand réseau très-irrégulier, formé par des linéoles orangées plus ou moins fines et anguleuses.

Long. 55 millim.

Habite

Par son système de coloration cette espèce appartient à la division des Draps-d'or; seulement le réseau dont elle est ornée est remarquable par la largeur et l'irrégularité de ses mailles. Son test est aussi plus mince.

( Collect. de M<sup>me</sup> DUPONT. )

Pl. LXXIII, fig. 2.

C. testâ cylindraceo-turbinatâ, ad angulum spirale inflatâ, basim attenuatâ; subrubrâ, albo-fasciatâ, maculis rubris tinctâ, lineis fuscis transversis ornatâ; spirâ elatâ, striatâ rubro-maculatâ.

Coquille turbinée, cylindrique, renflée vers son angle spiral, atténuée à la base. La spire, très-élevée, forme environ le tiers de la longueur totale; elle est conique et un peu mucronée au sommet; on y compte neuf ou dix tours finement striés en dessus, portant vers leur angle externe les traces à peine visibles d'une petite carène marginale que l'on retrouve assez prononcée sur le dernier tour; celui-ci est lisse à l'exception de sa base où l'on observe quelques stries obliques. La coquille est rose ou rougeâtre avec une fascie transverse blanche située un peu au-dessous du milieu du dernier tour; cette fascie est accompagnée de maculations d'un rouge-brun; une fascie à peu près semblable occupe l'angle spiral, et enfin des maculations de même couleur enveloppent le canal. Toute la surface est en outre traversée par des lignes brunes très-fines. La spire offre de grandes taches rouges séparées par des intervalles blancs. L'ouverture est rosée à l'intérieur.

Long. 24 millim.

Habite

Jolie espèce remarquable par sa forme allongée, subcylindrique, par l'élevation de sa spire et sa coloration rougeâtre fasciée de blanc et tachetée de rouge.

(Collect. de M. LOROIS.)

Pl. CIX, fig. 1.

C. testâ fusiformi turrîtâ, medio inflatâ, extremitatibus valda attenuatis; albo-  
 tuescente; spirâ elatâ, acuminatâ, tuberculis subcompressis coronatâ, ultimo  
 anfractu transversim costatoque tuberculifero, interstitiis longitudinaliter stria-  
 tis; labro acuto flexuoso.

Coquille allongée, fusiforme, turriculée, renflée au milieu, fortement atténuée vers ses extrémités. La spire est acuminée, très-élevée et forme près de la moitié de la longueur totale; elle se compose de douze ou treize tours étroits, tectiformes, garnis de stries décurrentes, et dont la suture est ornée d'une rangée de tubercules un peu comprimés qui sont portés sur une espèce de cordon décurrent. Toute la surface du dernier tour est traversée par des côtes saillantes chargées de petits tubercules moniliformes. L'intervalle de ces côtes est pourvu de stries verticales extrêmement fines. L'ouverture est fort étroite: le bord droit est mince, tranchant, flexueux: la coquille est d'un blanc jaunâtre très-pâle.

Long. 52 millim.

## Habite

Cette charmante espèce, dont nous devons la communication à M. Lorois, a une forme très-distincte, quoique offrant quelque rapport avec le *Conus Orbigny*; mais sa spire est beaucoup plus élevée, son dernier tour plus atténué vers la partie inférieure, de plus, ses côtes transverses sont surmontées de tubercules moniliformes.

**231. CÔNE CRÉTACÉ.** *Conus cretaceus*, NOBIS.

(Collect. de M. BERNARDI.)

Pl. XCIX, fig. 1.

*C.* testâ turbinatâ, subelongatâ, basim versûs lirâtâ; albidâ; spirâ conicâ, gradatâ; ultimo anfractu subtûs concavo, punctis niveis in seriibus transversim dispositis ornato; labro dextro sinuato, in medio inflexo.

Coquille turbinée, assez régulièrement conique. La spire est médiocrement élevée; elle est formée de sept ou huit tours un peu étagés et lisses; l'angle spiral du dernier, qui est un peu excavé, est bien marqué; la moitié inférieure de ce tour porte une dizaine de sillons transverses assez larges et distants entre eux. L'ouverture est arquée dans sa longueur; elle s'élargit vers sa base; le bord droit est mince et il se détache de l'avant-dernier tour par une échancrure large et profonde. La coquille est d'un blanc grisâtre; le dernier tour est tacheté de points d'un blanc de lait, disposés par séries transverses.

Long. 52 millim.

Habite

Cette espèce, très-distincte de ses congénères, est remarquable par la disposition de sa coloration, où paraissent bien les petites taches blanches qui garnissent la surface de son dernier tour.

**272. CÔNE DACTYLE.** *Conus dactylosus*, NOBIS.

(Collect. de M. BERNARDI.)

Pl. XCVII, fig. 2.

C. testâ angustâ, elongato-cylindraceâ, tenuissimè decussatim striatâ; luteo-pallidâ, lineolis fulvis tenuissimisquæ areolatis quadrifasciatâ; spirâ convexo-obtusâ, apice mucronato.

Coquille allongée, étroite, cylindrique, atténuée vers sa partie inférieure. La spire est peu élevée, obtuse, mucronée au sommet; on y compte neuf tours étroits, légèrement convexes en dessus; le dernier, au contraire, est un peu concave et canaliculé; son angle

GENRE CÔNE.

307

spiral est bien marqué. Toute la surface est couverte de stries transverses et longitudinales entrecroisées très-fines et très-régulières. La coloration consiste en un fond d'un jaune clair orné de quatre fascies transverses, distantes entre elles; ces fascies, blanchâtres, sont remplies par un réseau très-fin et très-délié qui est formé de petites linéoles fauves. La spire est un peu plus foncée que le reste de la coquille.

Long. 36 millim.

Habite

Petite espèce extrêmement élégante de forme et surtout de coloration. Les quatre fascies alvéolées de son dernier tour la distinguent facilement de ses congénères.



**230. CÔNE DÉCRÉPIT.** *Conus decrepitus*, Nobs.

(Collect. de M. BERNARDI.)

Pl. XCIX, fig. 4.

C. testâ oblongâ, tenui, bulloïdeâ, supernè inflatâ ; omnius minutissimè transversim striatâ ; albâ, maculis elongatis, cinereo-fulvis, irregularibus passim areolatis ornatâ, punctis quadrangulis intermissis ; spirâ conico-obtusâ, longitudinâliter flammulatâ.

Coquille turbinée, mince, bulloïde, renflée à sa partie supérieure, à plans latéraux arrondis et obtus vers l'angle spiral, légèrement convexes sur tout le reste. La spire est conique, un peu obtuse, elle est formée de cinq ou six tours. La superficie de la coquille est couverte de stries transverses extrêmement fines, égales entre elles ; celles de la base du canal sont un peu plus grosses. La coloration consiste en un fond blanchâtre sur lequel on voit de nombreuses maculations de couleur fauve ou grise ; ces maculations, de forme irrégulière, mais le plus souvent allongées, s'entrecroisent de manière à former sur certains points une sorte de réseau ; dans d'autres parties, elles sont disposées à peu près parallèlement et produisent des espèces de fascies ; enfin il existe dans leurs intervalles des séries transverses de petites taches quadrangulaires de la même couleur.

Long. 38 millim.

Habite l'océan Austral, les côtes de la Nouvelle-Hollande.

**240. CÔNE DE DUPONT.** *Conus Dupontii*, NOBIS.(Collect. de M<sup>me</sup> DUPONT.)

Pl. LXI, fig. 2.

C. testâ turbinatâ, brevi, supernè inflatissimâ, ad basim valdè attenuatâque coarctatâ, maculis albis et fuscis irregularibus pictâ; spirâ brevi obtusâ, apice mucronato.

Coquille turbinée, extrêmement élargie et renflée vers sa partie supérieure, atténuée et un peu étranglée à sa base; elle est formée de sept tours étroits, le dernier très-ample: son angle spiral est arrondi et obtus. Toute la surface est lisse, à l'exception de la partie inférieure qui est pourvue de sept ou huit sillons obliques très-fins et très-rapprochés entre eux. La spire est peu élevée, conique, mucronée au sommet. L'ouverture est sinueuse, un peu dilatée vers sa partie inférieure, la partie parallèle de la columelle offrant une sorte de pli oblique. Cette coquille, d'un fond blanchâtre, est parsemée de grandes taches brunes très-irrégulières, comme lacérées et réduites, vers certaines parties, en petites linéoles.

Long. 25 millim.

## Habite

Jolie espèce qui se distingue de toutes ses congénères par sa forme raccourcie. Elle offre pourtant une certaine analogie avec notre *Conus africanus*.

**237. CÔNE ÉCHINULÉ.** *Conus echinulatus*, NOBIS.

Pl. CV, fig. 2.

C. testâ minimâ, turbinatâ, elongatâ; albâ; spirâ elatâ, conico-acutâ, subgradatâ; anfractibus subtùs planibus octo; ultimo seriibus granulato, ad basim obliquè sulcato.

Coquille turbinée, petite, allongée. La spire, très-élevée, forme près du tiers de la longueur totale; elle est conique et acuminée; on y compte huit tours étroits, lisses en dessus et un peu étagés; le dernier est orné, dans toute son étendue, de séries transverses de granulations assez saillantes et pointues; on voit encore vers sa partie inférieure sept ou huit sillons obliques bien prononcés. L'ouverture est étroite, régulièrement allongée et terebelliforme. La coquille est entièrement blanche.

Long. 18 millim.

**Habite**

Petite espèce assez commune, remarquable par sa forme régulièrement conique, par sa spire très-élevée et un peu étagée, mais surtout par les séries de granulations saillantes et pointues qui ornent la surface de son dernier tour.

**305. CONE D'ÉLISA.** *Conus Elisæ*, NOBIS.

(Collect. de M. BOIVIN.)

Pl. LXIV, fig. 1-1a.

C. testâ cylindraceo-turbinatâ, crassâ, infernè subrectè attenuatâ; fusco-castaneâ, transversim tenuissimè reticulatâ; interstitiis punctis albis moniliformibus articulatis; spirâ conico-obtusâ.

Coquille cylindrique, turbinée, épaisse, presque régulièrement atténuée vers la base. La spire est un peu élevée, conique, obtuse; on y compte six tours convexes à suture profonde et bien marquée; le dernier, légèrement concave en dessus, a son angle spiral obtus et arrondi, mais saillant. La coquille est d'un brun marron plus ou moins foncé; dans le jeune âge, on distingue très-bien sur sa surface deux fascies transverses formées d'un réseau extrêmement fin,

342

GENRE CÔNE.

circonscrit par de petites taches arrondies; l'une de ces fascies occupe l'angle spiral du dernier tour et se retrouve sur la totalité de la spire; l'autre est située un peu au-dessous de la partie moyenne de la coquille. Leurs intervalles sont marqués de lignes transverses moniliformes extrêmement fines et comme articulées; sur les individus adultes, ces lignes dominent les fascies, qui sont alors à peine visibles.

Long. 52 millim.

Habite

Jolie espèce dont nous devons la connaissance à l'extrême obligeance de M. Boivin. Elle est remarquable à la fois par sa forme, qui rappelle un peu le *Conus terebra*, et par le réseau très-fin qui compose sa coloration. M. Reeve, dans son supplément de *Conchologia Iconica*, pl. 9, fig. 280<sup>b</sup>, a fait représenter pour cette espèce une variété du *C. monachus*, et sur la même planche, fig. 280, il a donné, comme jeune du même Cône, une coquille qui n'est autre que mon *Conus stellatus*, espèce cependant bien distincte.

**44. CONE ÉMAILLÉ.** *Conus encaustus*, NOBIS.

(Collect. de M. PREVOST.)

Pl. XIV, fig. 2.

C. testâ oblongo-turbinatâ, transversim striatâ, fulvâ aut rubescente, punctis albis lineolisque fusciscentibus vicissim aspersâ, albo-bizonatâ; spirâ mucronatâ; sulcis prominentibus.

Coquille conique, turbinée, à spire peu élevée, mucronée; les tours, au nombre de sept, sont étroits, striés circulairement; leur angle externe est pourvu d'une rangée de tubercules arrondis et très-prononcés; le dernier tour est luisant; sa moitié supérieure est striée transversalement, et sur le reste jusqu'à la base, ces stries se changent en sillons élevés. L'ouverture est fort étroite, colorée d'un brun fauve dans le fond. A l'extérieur, la coquille est de couleur fauve ou rougâtre, parsemée de points blancs allongés, souvent irréguliers de forme, disposés en séries transverses, très-rapprochés les uns des autres et alternés par de petits traits bruns. Les taches blanches forment deux zones; l'une placée vers la partie supérieure du dernier tour; l'autre au-dessous du milieu du même tour. Des maculations brunes ornent les interstices des tubercules.

Long. 26 millim.

Habite

Malgré l'analogie que cette coquille paraît avoir avec plusieurs varié-

tés du *Conus minimus*, elle doit cependant constituer une espèce particulière; elle est surtout remarquable par la disposition de ses taches et sa couleur qui lui donnent l'aspect d'une mosaïque.

**277. CONE FASCIÉ.** *Conus fasciatus*, NOBIS.

(Collect. de M. LOROIS.)

Pl. CIX, fig. 2.

C. testâ elongatø-turbinatâ; albo-nebulosâ, transversim bifasciatâ, fasciis luteo-aurantiis, seriebus punctulis nigris articulatis, interstitiis æqualiter punctulatis; spirâ acutâ, acuminatâ; columellâ infernè contortâ.

Coquille turbinée, un peu allongée, à plans latéraux assez droits et réguliers. La spire est peu élevée; elle forme environ le cinquième de la longueur totale: elle est conique et acuminée au sommet; on y compte dix tours étroits; les inférieurs sont légèrement canaliculés en dessus et saillants près de la su-

312

GENRE CÔNE.

ture; le dernier est lisse, excepté vers sa base qui est munie d'une douzaine de sillons obliques; l'angle spiral de ce tour est bien marqué. L'ouverture est étroite. La columelle est légèrement tordue et excavée à sa base. La coloration est d'un blanc nuageux; la surface est ornée de deux fascies transverses d'un jaune orangé assez pâle, garnies de lignes ponctuées noirâtres et de petites taches blanches subquadrangulaires; l'intervalle de ces fascies présente aussi des lignes transverses de petits points jaunâtres un peu plus distants entre eux. La spire est maculée de petites taches irrégulières brunes.

Long. 42 millim.

Habite

Cette espèce rappelle, dans une certaine limite, le *Conus monile*, soit par sa forme générale, soit par son système de coloration; elle en est distincte par sa spire plus élevée, plus allongée, moins pyramidale. La coloration aussi est plus pâle; les lignes ponctuées sont beaucoup plus fines; les fascies mieux marquées et plus larges.



**281. CÔNE DE GABRIEL.** *Conus Gabriellii*, CHENU.

(Collect. de M. DELESSERT.)

Pl. LXXIV, fig. 4.

C. testâ elongato-turbinatâ, supernè obtusiusculâ ; cinereâ, maculis fuscis irregularibusque laciniatis obscurè fasciatis ornatâ, puncticulis albis seriatim munitâ ; spirâ subelatâ ; apice prominulo, acuminato ; ultimo anfractu basi latissulcato.

Coquille allongée, turbinée. La spire est peu élevée, convexe sur une partie de son étendue, conique et acuminée vers le sommet ; on y compte environ douze

316

GENRE CÔNE.

tours dont les premiers sont très-étroits ; l'angle spiral du dernier est arrondi ; la moitié supérieure de ce tour est lisse, l'inférieure est pourvue de dix sillons transverses très-espacés entre eux. La coquille est d'un fond gris cendré, orné de taches brunes très-irrégulières, à bords laciniés, formant trois espèces de fascies transverses interrompues ; en outre, toute la surface est parsemée de petits points blancs disposés par séries transverses, comme articulées. La spire est veinée de lignes brunes ; l'angle spiral du dernier tour est accompagné d'une fascie étroite d'un gris cendré.

Long. 40 millim.

Habite

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété du *Conus cinereus*, cependant on y distingue constamment quelques différences. M. Chenu a cru, pour cette raison, devoir la constituer comme espèce et la dédier au frère d'un homme si justement regretté par les savants et les artistes qui trouvaient en lui un protecteur éclairé ; savant lui-même qui a puissamment contribué à répandre en France le goût et l'étude de l'histoire naturelle.

184. **CONE CHAGRINÉ.** *Conus granarius*, NOBIS.

(Collect. de M. BERNARDI.)

Pl. XCVIII, fig. 1.

C. testâ oblongâ, supernè dilatâ, subinflatâ, infernè coarctatâ; granulis creberrimis seriatim dispersis ornatâ; fuscâ, maculis obscuris pictâ; spirâ exsertâ, acuminatâ, medio subnodulosâ.

Coquille turbinée, large vers sa partie supérieure, atténuée vers sa base; la spire est très-élevée, acuminée, pointue au sommet, un peu étagée. On y compte une dizaine de tours étroits et anguleux; les premiers et les derniers sont lisses, les autres sont couronnés sur leur angle d'une rangée de petits tubercules. Toute la surface du dernier tour est chargée de petits

216

GENRE CÔNE.

grains saillants disposés en séries [transverses très-nombreuses et comme articulées. La coquille est d'un blanc verdâtre, parsemé de grandes taches brunes irrégulières; la spire est pourvue des mêmes taches, à l'exception des premiers tours qui sont d'un brun clair uni.

Long. 35 millim.

Habite

Cette jolie espèce est très-facile à distinguer à cause des séries de granulations dont elle est ornée. Ses grandes maculations brunes ont quelquefois tendance à former des fascies.

Nous devons la connaissance de cette nouvelle espèce à M. Bernardi, dont nous ne pouvons trop louer l'obligeance.



95. **CÔNE GRISÂTRE.** *Conus griseus*, NOBIS.

( Collect. de M<sup>me</sup> DUPONT. )

Pl. LXIII, fig. 2.

C. testâ oblongo-turbinatâ, basim versûs subtiliter sulcatâ, griseâ, longitudinaliter fulvo-lineatâ ; sulcis æqualiter distantibus ; spirâ depressiusculâ, maculis brunneis inæqualibus tinctâ ; suturâ lineali undulosè marginatâ.

Coquille oblongue, turbinée, à spire conique et peu élevée. On y compte dix tours médiocrement concaves dont la suture linéaire est bordée d'un petit bourrelet onduleux. La surface est lisse, excepté vers la base, où l'on voit un petit nombre de sillons trans-

GENRE CÔNE.

115

verses, égaux, également distants entre eux. L'ouverture est étroite, blanche, un peu dilatée à sa base ; le bord droit est mince et tranchant, arqué dans sa longueur ; son sommet est terminé par une échancrure assez profonde. Cette coquille, sur un fond d'un blanc grisâtre, présente quelques lignes longitudinales irrégulières, nuancées de fauve. La spire est tachetée de maculations brunes ou fauves, inégales et allongées.

Long. 40 millim.

Habite les côtes septentrionales d'Afrique.

Ce Cône a beaucoup d'analogie avec le *C. sugillatus* ; mais il en est constamment distinct par sa spire plus élevée et par la coloration presque uniforme de son dernier tour.

**255. CONE DE GUBBA.** *Conus Gubba*, NOBIS.

(Collect. de M. GUBBA.)

Pl. CIV, fig. 1.

C. testâ elongatâ, subcylindricâ, fusco-nigrâ, spirâ conico-obtusâ, ultimo anfractu supernè obtuso, sulcis magnis transversis distantibusque replentibus partem dimidiam inferiorum; aperturâ intûs violacêa, fusco marginatâ.

Coquille allongée, subcylindrique, légèrement renflée vers le milieu. La spire est conique, obtuse au sommet; on y compte huit tours étroits, un peu convexes; l'angle spiral du dernier est arrondi et obtus, sa moitié inférieure est pourvue d'environ douze gros sillons transverses, très-distants entre eux. L'ouverture

49

292

GENRE CÔNE.

ou dix tours anguleux et canaliculés en dessus; l'angle spiral du dernier est bien marqué; toute la surface de ce tour est lisse; seulement la partie supérieure du canal offre quelques petits sillons obliques. La coloration consiste en un fond orangé assez vif, marqué de trois fascies transverses blanches, distinctes entre elles, et portant des séries articulées de petits points orangés ressemblant à des notes de musique; entre les fascies on remarque de grandes taches blanches ou orangées, de forme irrégulière, mais affectant souvent une disposition de séries transverses. L'angle spiral de la spire, qui est blanche dans la gouttière, est garni de linéoles orangées irrégulières plus ou moins anguleuses.

Long. 85 millim.

Habite l'océan Asiatique, vers les côtes de l'île d'Oma.

Belle espèce encore fort rare et recherchée dans les collections, remarquable par la disposition de sa coloration.

**226. CONE TRUITÉ.** *Conus guttatus*, NOBIS.

(Collect. de M. LARGILLIERT.)

Pl. CV, fig. 4.

G. testâ turbinatâ, supernè inflato-turgidâ; fulvâ, maculis et punctis fuscis passim ornatâ; spirâ obtusâ.

Coquille turbinée, raccourcie, élargie et renflée vers sa partie supérieure. La spire est surbaissée et obtuse; on y compte six tours; l'angle spiral du dernier est très-arrondi et obtus; il est lisse sur toute son étendue, excepté vers sa base qui présente quelques petits sillons obliques. La coquille est d'un gris fauve, marquée de petits points bruns ou taches irrégulières éparses et peu nombreuses; ses points présentent quelquefois l'aspect de séries d'ailleurs fort irrégulières.

Long. 52 millim.

Habite

Cette espèce est très-singulière par sa coloration. Elle rappelle le *Conus betulinus*, mais elle est beaucoup plus petite.

**195. CONE HÉPATIQUE.** *Conus hepaticus*, NOBIS.

( Collect. de M<sup>me</sup> DUPONT. )

Pl. XCVII, fig. 3.

C. testâ turbinatâ, crassâ, transversim sulcatâ; luteo-virescente; spirâ depressâ, mucronatâ.

Coquille turbinée, formant un cône assez régulier, à plans latéraux, très-légèrement convexes. La spire est très-surbaissée, à peine mucronée : elle est formée de sept tours légèrement excavés et canaliculés en dessus. Toute la surface du dernier est traversée de stries fines et parallèles, groupées par faisceaux, de manière à laisser voir un intervalle assez large entre chacun des groupes. La coquille est verdâtre ou légèrement jaune en certains endroits.

228

GENRE CÔNE.

Long. 40 millim.

Habite

Espèce bien facile à distinguer à cause de sa forme régulière, de la disposition des stries de sa surface, et surtout de sa teinte uniforme.

**223. CÔNE HYBRIDE.** *Conus hybridus*, NOBIS.

(Collect. de M DELESSERT.)

Pl. LXXXIII, fig. 1.

C. testâ turbinatâ, tenui, supernè inflatâ, basi attenuatâ; cinereo-olivaceâ. submedio-fasciatâ, maculis irregularibus fuscis et punctis albis aspersâ; spirâ subulatâ, turgidâ, apice acuto, mucronato; aperturâ intûs violaceâ.

Coquille turbinée, mince, très-renflée à son sommet, atténuée vers sa base. La spire, médiocrement élevée, est convexe dans une partie de son étendue. Le sommet est saillant et mucroné. Les tours, au nombre de dix ou douze, sont aplatis et lisses; les premiers présentent quelquefois des stries fines et décourantes; le dernier est très-renflé; l'angle spiral en est arrondi et obtus. Toute la surface est lisse jusqu'à la base qui présente quelques stries fines à peine visibles. L'ouverture, dilatée à la partie inférieure, offre des bords un peu flexueux; le bord droit, mince et tranchant, est profondément échancré à sa partie supérieure. La coloration consiste en un fond d'un gris olivâtre couvert de maculations brunes très-irrégulières entremêlées de petits points de même couleur et d'autres points d'un blanc laiteux. L'intervalle de ces taches et de ces points est un peu plus clair que le fond lui-même qu'on distingue bien en fascie trans-

GENRE CÔNE.

237

verse un peu au-dessous du milieu du dernier tour. L'ouverture est d'un violet devenant plus brun sur le bord droit.

Long. 42 millim.

Habite

Jolie espèce bien distincte, ayant un peu l'aspect du *Conus mediterraneus*; mais sa forme plus élargie et la disposition de sa spire suffiraient pour la faire reconnaître.



**275. CONE CISELÉ.** *Conus insculptus*, NOBIS.

(Collect. de M. LARGILLIERT.)

Pl. XCIX, fig. 2.

C. testâ longissimo-pyramidatâ, angustâ; ferrugineâ; spirâ elatâ conico-acuminatâ; anfractibus octo, supernè angulatisque spiraliter striatis; ultimo transversim undiquè sulcato; basi subrecurvâ.

Coquille très-allongée, pyramidale, effilée vers le canal, qui est légèrement infléchi en dessus. La spire est assez élevée, conique et acuminée; on y compte huit tours étroits, marqués d'un angle caréné et de stries décurrentes; l'angle spiral du dernier est bien prononcé; ce tour est couvert de sillons transverses espacés entre eux et finement pointillés; sa partie inférieure se retrécit en une sorte de canal légèrement recourbé en dessus. L'ouverture est étroite, la colu-

310

GENRE CÔNE.

melle un peu sinueuse. Toute la coquille est d'un brun ferrugineux.

Long. 25 millim.

Habite la mer de Chine.

La forme très-effilée de cette coquille, son canal étranglé et infléchi en dessus, ses sillons transverses, la rendent bien facile à distinguer de ses congénères.

187. **CÔNE JASPÉ.** *Conus jaspideus*, Nonis.

(Collect. MASSÉNA.)

Pl. LV, fig. 4.

C. testâ turbinatâ, ovato-conicâ, basi attenuatâ, creberrimè sulcatâ, puitis seriatim dispositis, flammulis undulatis characteribus aurantio-fuscis ornatâ, fasciâ aurantiâ supernè cingulatâ; spirâ conicâ, fusco radiatim strigatâ; âce roseo.

Coquille ovale, conique, turbinée, atténuée vers la

GENRE CÔNE.

219

partie inférieure et légèrement renflée au milieu; elle est formée de six tours; l'angle supérieur du dernier est un peu obtus. La spire est médiocrement élevée, conique; la suture est profonde et bien marquée. Le dernier tour est lisse jusqu'à la partie inférieure qui est garnie d'une douzaine de sillons transverses très-fins et parallèles entre eux. Le fond de coloration est blanc avec des séries transverses de petits points et des flammules longitudinales irrégulièrement onduleuses, d'un brun fauve ou orangé, formant des espèces de fascies. La partie supérieure du dernier tour est ceinte d'une fascie assez large, bien nettement accusée et d'un jaune orangé. La spire est veinée de flammules longitudinales de couleur fauve et disposées en rayons. Le sommet a une teinte rosée.

Long. 33 millim.

Habite la baie d'Algoa.

Cette jolie espèce a la forme générale du *Conus mediterraneus*, mais sa coloration la rend aussi distincte de ce cône que de tous les autres. Elle est surtout remarquable par la fascie orangée bien marquée qui entoure la portion supérieure de son dernier tour.

**278. CONE LACINULÉ.** *Conus lacinulatus*, NOBIS.

(Collect. de M. LOROIS.)

Pl. CVIII, fig. 2.

C. testâ pyramidali-turbinatâ, basi attenuatâ; aurantiâ, fasciis duobus albis, transversis laciniatis ornatâ; spirâ conico-obtusâ; anfractibus octo, ultimo subtilis planulato, basi granulis seriatis munito.

Coquille turbinée, pyramidale, épaisse, à spire large, peu élevée, conique; on y compte trois tours

GENRE CÔNE.

315

étroits: le dernier est pourvu d'un angle spiral bien marqué. Toute la superficie de ce tour est lisse; sa base porte seulement deux ou trois séries transverses de petites granulations. L'ouverture est étroite, linéaire et à peu près égale. La coquille est d'un orangé pâle, avec deux larges fascies transverses blanches; ces fascies, dont les bords sont profondément découpés, surtout d'un côté, occupent la partie supérieure et le tiers inférieur du dernier tour; vers la base on remarque quelques lignes transverses rougeâtres. La spire est tachetée de blanc ou de jaune orangé.

Long. 38 millim.

Habite

Cette jolie espèce, dont l'aspect général rappelle un peu le *Conus lithoglyphus*, est distincte de celui-ci par ses deux fascies blanches; en outre, elle porte sur la base de son canal des séries de granulations qui la rendent très-remarquable.



**208. CÔNE DE LAMARCK.** *Conus Lamarckii*, NOBIS.

(Collect. LAM.)

Pl. LXXXIII, fig. 4.

C. testâ turbinatâ, crassâ, supernè turgidâ; luteâ, duobus fascibus, maculis albis reticulatis; spirâ rotundâ, obtusâ, mucronatâ, decurrente excavatâ, albo maculatâ.

Coquille épaisse, turbinée, renflée vers sa partie supérieure, à plans latéraux légèrement convexes, surtout vers l'angle spiral, qui est arrondi; la spire, médiocrement élevée, est convexe, obtuse, mucronée au sommet; on y compte six tours marqués au-dessous de la suture d'une gouttière superficielle décurrente; la base du dernier offre une dizaine de petits sillons assez rapprochés les uns des autres. La coloration est élégante; elle consiste en un fond d'un jaune orangé traversé par deux fascies formées de petites taches blanches disposées en réseau; la fascie qui occupe la partie supérieure est la plus étroite et la mieux limitée; l'autre, plus large, s'étend plus ou moins vers la partie inférieure. La spire, d'une coloration plus foncée, est marquée de taches brunes et blanches.

Long. 58 millim.

## Habite

Jolie espèce confondue par Lamarck avec le *Conus luzonicus*, et constituant sa variété *b*. Mais il suffit de jeter les yeux sur les figures qui représentent ces deux espèces pour constater leurs différences, soit de forme, soit de coloration.

181. CÔNE DE LARGILLIERT. *Conus Largillierti*, NOBIS.

(Collect. de M. LARGILLIERT.)

Pl. XCVIII, fig. 3, et pl. CI, fig. 4-4\*.

C. testâ ovatâ, basi attenuatâ, coarctatâ; aurantio-fuscâ, medio-albifasciatâ, tenuis angustis rufo-fusco alboque articulatis undiquè cingulatâ; spirâ elatâ, acutâ, irregulariter tessellatâ.

Coquille un peu épaisse, à plans latéraux convexes et resserrés vers la naissance du canal; la spire est très-élevée, acuminée et pointue; l'angle spiral du dernier tour est bien marqué. Toute la surface est lisse à l'exception de la base qui porte trois ou quatre sillons transverses. La coquille est fauve ou rousâtre, avec des lignes transverses de petits points rouges ou orangés, très-rapprochés entre eux, comme articulés, et se confondant même quelquefois: ces lignes

GENRE CÔNE.

215

alternent avec d'autres lignes plus petites. Vers le tiers inférieur de la coquille, on aperçoit une fascie transverse formée de taches blanchâtres irrégulières. La spire est maculée de taches rouges irrégulièrement quadrilatères.

Long. 34 millim.

Habite les côtes du Mexique.

Espèce fort remarquable, ayant quelque ressemblance avec le *Conus japonicus*, mais qui s'en distingue surtout par sa forme moins élargie vers la partie supérieure; elle présente d'ailleurs des variations assez notables; ainsi, chez certains individus, les rangées de points sont beaucoup moins nombreuses et moins rapprochées entre elles, et quelquefois la coquille prend une teinte générale grisâtre. (Voir notre pl. 101, fig. 1, 1\*.)

Nous avons dédié cette belle espèce à M. Largilliert, connu depuis longtemps par sa riche collection de coquilles.

**274. CÔNE EFFILÉ.** *Conus longurionis*, NOBIS.

(Collect. de M. PREVOST.)

[Pl. XCII, fig. 6.

C. testâ elongatissimâ, angustâ, utrinquë attenuatâ, subulatâ, transversim sulcatâ ; albo-luteâ, maculis rufo-aurantiis quadrangularis, transversim obsolete bifasciatâ ; spirâ elatiore.

Coquille très-allongée, étroite, subulée. La spire est élevée, acuminée et forme environ le tiers de la longueur totale ; on y compte quatorze ou quinze tours étroits, arrondis, légèrement étagés, réunis par une suture profonde ; l'angle spiral du dernier est obtus ; toute la surface de ce tour est couverte de sillons transverses assez gros ; sa base est très-acuminée et largement recourbée vers le dos. La coquille est blanchâtre ou légèrement jaune, ornée de fascies trans-

GENRE CÔNE.

309

verses distantes entre elles ou interrompues, formées par des taches irrégulièrement quadrangulaires, de couleur rougeâtre ou orangée.

Long. 36 millim.

Habite

Cette jolie espèce, d'une forme extrêmement allongée, est remarquable par sa spire très-acuminée et par les sillons qui couvrent son dernier tour.

Par suite d'une erreur typographique, elle a été désignée à tort sur notre planche 92, fig. 6, sous le nom de *C. subulatus*.

**75. CONE DE LOROIS.** *Conus Loroisii*, NOBIS.

(Collect. de MM. LOROIS et BOIVIN.)

Pl. LXV, fig. 1.

C. testâ turbinatâ, crassâ, cinereo-virescente, transversim lineis distantibus, viridibus circumcinctâ; spirâ convexâ; ultimo anfractu suprâ lævigato, infrâ striato; aperturâ griseo-violacéâ.

Coquille turbinée, épaisse, arrondie et bombée vers le haut. La spire est ordinairement convexe, peu élevée, composée de dix tours assez aplatis; les supérieurs sont presque granuleux; leur suture est peu profonde, ondulée et bien marquée jusqu'au sommet, qui est légèrement saillant et pointu; la moitié supérieure du dernier tour est lisse; la partie inférieure présente des stries circulaires, rares d'abord, écartées

92

GENRE CÔNE.

entre elles, peu apparentes, mais grossissant et se resserrant à mesure qu'elles approchent de la base. L'ouverture est d'un gris violacé dans le fond; son extrémité supérieure offre une échancrure assez profonde et sa base un bourrelet oblique et saillant; le bord droit est tranchant, marqué dans toute sa longueur d'un liséré fauve. Toute la surface de la coquille est d'un cendré verdâtre, traversé par des lignes plus foncées que le fond de la coloration; ces zones sont étroites, assez régulièrement espacées entre elles, le plus souvent traversées par des stries d'accroissement arquées, très-rapprochées les unes des autres sur la spire et plus espacées sur le reste de la coquille.

Long. 70 millim.

Habite la mer de l'Inde.

Nous ne connaissons encore qu'un petit nombre d'individus appartenant à cette espèce. Quoique très-voisins, sous beaucoup de rapports, du *Conus minimus*, ils ont des caractères qui nous semblent suffisants pour les distinguer de celui-ci. C'est à M. Lorois, préfet du Morbihan, que nous avons dû la connaissance de cette espèce, et nous nous sommes empressé de lui donner le nom d'un amateur dont les recherches assidues contribueront à compléter les richesses conchyliologiques.



**259. CÔNE DE MADELEINE.** *Conus Magdalencæ*, CHENU.

(Collect. de M. DELESSERT.) CHENU, *Leçons élémentaires*,  
pl. 12, fig. 7.

Pl. LXIX, fig. 4.

C. testâ subcylindraceâ, turbinatâ, leviter inflatâ; aurantiâ, infrâ medio-fasciatâ, lineis transversis distantibus fuscorum punctorum articulatis ornatâ, maculis albis sparsis; spirâ conico-obtusâ, albo-maculatâ.

Coquille turbinée, subcylindrique, un peu renflée

294

GENRE CÔNE.

vers sa partie moyenne. La spire est obtuse et peu élevée; on y compte huit tours étroits; le dernier est légèrement canaliculé en dessus; l'angle spiral en est obtus et arrondi; toute la surface est lisse, à l'exception de quelques stries longitudinales d'accroissement qu'on y distingue. La coloration consiste en un fond d'un jaune orangé, sur lequel se dessine, un peu au-dessous de la partie moyenne du dernier tour, une fascie transverse blanchâtre articulée de points bruns; d'autres lignes également articulées, mais plus fines et distantes entre elles, ornent le reste de la coquille; enfin des maculations blanchâtres y sont éparses, mais elles occupent plus particulièrement l'angle spiral du dernier tour.

Long. 52 millim.

**Habite**

Cette espèce ne paraît présenter au premier aspect rien de particulier; mais la disposition de sa coloration la rend bien distincte de ses congénères; elle semble offrir pourtant quelques rapports avec certaines variétés du *Conus ranunculus* de Brug.

**315. CÔNE DE MIGHELS.** *Conus Mighelsi*, Nobis.

(Collect. de M. LARGILLIERT.)

Pl. CIII, fig. 1.

C. testâ turbinatâ, albâ, punctis nigris per seriebus, transversim articulis ornatâ, cum fasciâ ferrugineâ in medio cinctâ; spirâ coronatâ, nigro-maculatâ; aperturâ intus violacâ; ultimo anfractu supernè lævi, infernè transversim granulato.

Coquille assez régulièrement turbinée, très-étroite vers sa partie inférieure. La spire est peu élevée, conique et mucronée au sommet; elle est couronnée par une rangée de tubercules médiocrement prononcés. L'angle spiral du dernier tour est bien marqué; la moitié supérieure de ce tour est lisse, l'autre moitié

GENRE CÔNE.

353

porte des séries transverses de petits tubercules. La coloration consiste en un fond blanchâtre sur lequel se détachent des séries de points noirs subquadrangulaires allongés et comme articulés; vers le milieu de la coquille, il existe une fascie transverse roussâtre plus ou moins interrompue. Le canal et l'intérieur de l'ouverture sont colorés de brun violacé.

Long. 56 millim.

Habite la mer des Indes.

Cette jolie petite espèce offre quelque analogie de forme avec le *Conus musicus*, mais elle en est nettement distincte par ses séries transverses de points noirs qui sont plus gros et par la fascie médiane. Nous sommes donc étonné que M. Reeve, qui a mentionné ce Cône d'après nos figures, l'ait rapporté au *C. musicus* lui-même à titre de variété; il suffit de comparer les figures des deux espèces pour se convaincre de leurs différences. M. Largilliert, à qui nous devons la communication de cette intéressante espèce qui fait partie de sa belle collection, lui avait déjà donné le nom de M. Mighels, docteur à Portland.

(Collect. de M. DELESSERT.) CHEMNITZ, t. XI, pl. 183,  
fig. 1786-1787.

Pl. LIX, fig. 4.

C. testâ turbinatâ, basi angustiore; cinerascence, maculis margis et rufis tinctâ, ficiatâ, lineis transversis punctatâ; spirâ conicâ, exsertâ, maculatâ, fauce brunâ.

Coquille turbinée, très-large vers sa partie supérieure, atténuée à sa base et légèrement rétrécie vers son milieu. La spire est assez élevée, régulièrement conique, formée de huit tours un peu convexes et faiblement étagés. La surface est lisse, à l'exception de la base du dernier tour qui présente sept ou huit sil-

218

GENRE CÔNE.

lons transverses et parallèles entre eux. La coloration consiste en un fond grisâtre articulé de petits points bruns disposés par séries transverses, très-rapprochés les uns des autres, et de grandes taches fauves ou rougeâtres nuageuses disposées sur le dernier tour de manière à former trois fascies transverses. L'angle supérieur de ce tour est orné d'une série de points noirs assez distants entre eux et que l'on retrouve sur les tours précédents; ceux-ci sont, en outre, parsemés de petites taches fauves. L'ouverture est étroite et colorée de brun.

Long. 35 millim.

Habite les côtes de Madagascar.

Cette espèce rappelle un peu par sa forme le *Conus cedonulli*, mais elle n'est pas couronnée; sa coloration aussi offre quelque ressemblance avec celui-ci, mais elle est beaucoup plus compliquée et ses taches qui la constituent sont plus larges et plus rares.

**196. CÔNE NODIFER.** *Conus nodiferus*, NOBIS.

(Collect. de M. BERNARDI.)

Pl. C, fig. 4.

C. testâ elongato-turbinatâ, transversim sulcatâque granulosâ ; spirâ elatâ, acuminatâ, angulatâ ; angulo maculis fuscis articulatâ.

Coquille allongée, formée de deux cônes opposés base à base : l'un, plus grand, constitue le dernier tour ; il est assez régulier, très-atténué vers sa base, et porte, sur toute son étendue, des sillons transverses dans l'intervalle desquels il existe des séries de petites granulations ; l'autre, plus petit et formant plus du tiers de la longueur totale, constitue la spire ; celle-ci est très-élevée, conique et acuminée ; on y compte sept ou huit tours un peu étagés, aplatis en dessus et marqués, sur leur partie externe, d'un angle assez saillant ; cet angle a une teinte blanche et est articulé de petites taches brunes, rougeâtres, qui le font paraître noduleux. Tout le reste de la coquille est jaunâtre.

Long. 38 millim.

Habite la mer des Indes.

GENRE CÔNE.

229

Charmante petite espèce, remarquable par sa forme régulière, par l'élevation de sa spire, sa surface grenue et les sillons de son dernier tour.



**283. CONE OBTUS.** *Conus obtusus*, NOBIS.

(Collect. de M. LOROIS.)

Pl. CIX, fig. 5.

C. testâ ovato-turbinatâ, supernè inflatâ, obtusâ, infernè attenuatâ ; cinereâ, maculis fuscis irregularibus longitudinaliter strigatâ ; anfractibus quinque angustis ; ultimo supernè rotundato, lævi, basi sulcato.

Coquille ovale, turbinée, renflée et obtuse à sa partie supérieure, atténuée vers sa base. La spire est très-courte, arrondie, formée de cinq tours légèrement convexes ; l'angle spiral du dernier est arrondi et obtus ; toute sa superficie est lisse ; sa base seule porte

318

GENRE CÔNE.

quelques gros sillons transverses. L'ouverture est étroite, un peu élargie vers sa partie inférieure. La coloration consiste en un fond gris cendré nuageux, couvert en grande partie par des maculations brunes très-irrégulières, plus ou moins étendues et formant des espèces de fascies transverses : l'une d'elles occupe l'angle spiral. L'intérieur de l'ouverture est d'un gris cendré ; le bord droit est liseré de brun.

Long. 24 millim.

### Habite

Cette petite espèce a aussi quelques rapports avec le *Conus cinereus*, principalement par son système de coloration, mais elle en diffère par sa forme renflée et obtuse au sommet et fortement atténuée, au contraire, vers la base ; sous ce rapport, elle aurait plus de ressemblance avec notre *Conus africanus*, mais la spire mucronée de celui-ci, et surtout sa coloration toute particulière, suffisent pour l'en distinguer.

**321. CÔNE OLIVACÉ.** *Conus olivaceus*, NOBIS.

(Collect. de M. VERREAUX.)

Pl. CXI, fig. 5.

C. testâ turbinatâ, pyriformi, subinflatâ; luteâ, obscurè trifasciatâ; spirâ breviorè acutâ, mucronatâ; fauce violacéâ, albo bifasciatâ.

Coquille turbinée, pyriforme, un peu renflée vers la partie supérieure, atténuée à la base. La spire est surbaissée, excavée, mucronée au sommet. L'angle spiral du dernier tour est arrondi et obtus; ce tour est lisse excepté vers sa base qui est munie d'environ quinze sillons obliques bien marqués. La coloration consiste en un fond jaunâtre sur lequel se détachent à peine deux ou trois fascies transverses, étroites, mal limitées et à peu près de la même couleur que le fond ou un peu plus foncées. L'ouverture est vivement colorée à l'intérieur d'un violet foncé; le bord droit est marqué de deux fascies blanches qui correspondent à celles de l'extérieur.

Long. 35 millim.

Habite

Cette espèce se rapproche un peu par sa forme générale du *Conus venulatus*, elle est pourtant plus pyriforme; sa coloration, au contraire, lui donne de l'analogie avec notre *Conus Blainvillèi*; mais elle est d'une teinte générale plus claire et n'a point de lignes transverses articulées.

276. **CÔNE PAGODE.** *Conus pagodus*, CHENU.

(Collect. de M. DELESSERT.) CHENU, *Leçons élémentaires*,  
pl. 12, fig. 2.

Pl. LXX, fig. 4.

C. testâ fusiformi-turbinatâ, ventricosissimâ, basi coarctatâ, transversim undiquè sulcatâ, interstitiis sulcorum cancellatis; spirâ exsertâ, acuminatâ, spirâliter striatâ; albâ, maculis quadrangularibus trifasciatis cinctâ.

Coquille turbinée, fusiforme, très-renflée et ventrue au milieu, atténuée vers ses extrémités; l'inférieure est étranglée et forme une sorte de canal assez long; la supérieure constitue la spire qui est très-élevée et forme le tiers environ de la longueur totale de la coquille; on y compte quatorze tours étroits, légèrement étagés et pourvus de stries décourantes; les premiers de ces tours portent une série de petits tubercules à peine visibles; le dernier présente un angle spiral lisse, mais bien marqué; toute son étendue est couverte de sillons transverses assez gros, dans l'interstice desquels on distingue de petites stries longitudi-

GENRE CÔNE.

311

nales qui font paraître ces sillons comme cancellés. La coquille, d'un fond blanc, est ornée de trois fascies transverses composées de taches rougeâtres irrégulièrement quadrangulaires. Ces fascies sont distantes entre elles et de largeur inégale, la supérieure est la plus large: elle est située un peu au-dessous de l'angle spiral; l'inférieure occupe la partie rétrécie du canal: elle est la plus étroite et peu marquée. La spire est aussi marquée de taches rougeâtres.

Long. 42 millim.

Habite les côtes de l'île de Taïti.

Singulière espèce, remarquable par sa forme, qui lui donne l'apparence d'un fuseau. Les sillons dont toute sa surface est traversée et sa coloration la rendent également bien distincte.

**238. CÔNE PAPILLEUX.** *Conus papillosus*, NOLIS.( Collect. de M<sup>me</sup> DUPONT. )

Pl. LXXII, fig. 4.

*C.* testâ turbinatâ, abbreviatâ, supernè inflato-angulatâ, ad basim attenuatâ ; albâ, granulosâ, interstitiis granulorum punctulis fuscis seriatim articulatis ; spirâ subelatâ, conico-acuminatâ, lævi ; ultimo anfractu granulis, per seriibus dispositis ornato, infernè sulcato.

Coquille turbinée, raccourcie, large et renflée vers sa partie supérieure. La spire, médiocrement élevée, est conique, acuminée et pointue ; on y compte huit tours lisses et un peu étagés ; l'angle spiral du dernier est bien marqué et entouré d'un large sillon au-dessous duquel commencent des séries transverses de granulations papilliformes, très-régulièrement disposées jusque vers la base où elles deviennent moins prononcées et sont même remplacées par de simples sillons. La coquille est blanche ; l'angle spiral est seulement articulé de petites pointes rougeâtres qui se retrouvent plus ou moins sur les premiers tours. L'intervalle des granulations est orné de points ou de petits traits, formant autant de lignes articulées qu'il y a de séries de granulations.

Long. 25 millim.

**Habite**

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec notre *C. echinulatus*, mais elle en est distincte par sa forme moins élancée, par ses granulations plus développées et surtout par les pointes rougeâtres et articulées qui occupent l'intervalle de ces granulations.

**230. CÔNE PAULINE.** *Conus Paulina*, NOBIS.

(Collect. de M. LOROIS.)

Pl. CVIII, fig. 5.

C. testâ turbinatâ; albo-cinereâ, maculis fuscis subquadratis transversaliter seriatis ornatâ; spirâ latâ, obtusiusculâ; ultimo anfractu supernè angulato, ad basim tenuè sulcato; aperturâ dilatâtâ.

Coquille turbinée, très-large vers sa partie supérieure. La spire est peu élevée, subconique, formée de cinq tours presque planes en dessus; l'angle spiral du

GENRE CÔNE.

315

dernier est bien marqué; ce tour porte, vers sa partie inférieure, vingt à vingt-cinq sillons transverses extrêmement fins et rapprochés entre eux. L'ouverture est large, surtout vers sa base. Le fond de la coquille est d'un blanc grisâtre, sur lequel sont disposées des taches brunes quadrangulaires plus ou moins grandes et irrégulières, formant, en général, des séries transverses. La spire est tachetée de la même manière: seulement les taches y sont toujours larges.

Long. 36 millim.

Habite

Cette espèce se distingue surtout de ses congénères par les sillons fins et nombreux qui occupent la partie inférieure de son dernier tour et son canal. Elle se rapproche un peu du *Conus proteus* par sa forme et son mode de coloration, mais sa spire est plus surbaissée et plus obtuse.

Nous sommes heureux de la dédier à madame Lorois, reconnaissant de l'obligeance dont le mari de cette dame veut bien nous donner une preuve si continue, en nous faisant connaître tant d'espèces nouvelles.



182. CÔNE DE PHILIPPI. *Conus Philippii*, NOBIS.

(Collect. de M. LARGILLIERT. )

Pl. XCVIII, fig. 2.

C. testâ turbinatâ, basi attenuatâ, albo-luteâ, punctis rubris transversim seriatim ornatâ; spirâ elatâ, exsertâ, fusco-maculatâ.

Coquille turbinée, très-régulièrement conique et très-atténuée vers sa partie inférieure. L'angle spiral, bien marqué et saillant sur les premiers tours, s'efface le plus souvent sur le dernier, où il est obtus et arrondi. La spire est élevée, acuminée et pointue; on y

214

GENRE CÔNE.

compte neuf ou dix tours étagés. La coloration consiste en un fond blanc ou jaunâtre sur lequel sont disposées transversalement des séries nombreuses et régulières de petits points rougeâtres. Ces séries sont plus rapprochées entre elles sur quelques parties de la coquille et ont tendance à former des fascies. L'angle spiral offre au lieu de points des maculations brunes irrégulières que l'on retrouve sur la spire; celle-ci est généralement plus claire que le reste de la coquille.

Long. 36 millim.

Habite les côtes du Mexique.

Jolie espèce voisine de notre *Conus Largillierti* par son mode de coloration, mais qui en est fort distincte par sa forme générale. Nous l'avons dédiée à M. Philippe de Cassel, amateur fort distingué. Cette rare coquille nous a été communiquée par M. Largilliert.

**289. CÔNE PUSTULÉ.** *Conus pustulatus*, NOBIS.

(Collect. de M. BERNARDI.)

Pl. CI. fig. 2.

C. testâ minimâ, crassiusculâ, abbreviatâ, supernè inflato-angulatâ; fuscâ, albo vel cinereo nebulatâ; spirâ conico-acuminatâ; ultimo anfractu transversim sulcato, interstitiis tuberculiferis.

Coquille turbinée, petite, épaisse, raccourcie, à plans latéraux très-convexes, fort élargie vers sa partie supérieure, atténuée et resserrée à sa base. La spire est médiocrement élevée, très-acuminée; on y compte huit ou neuf tours aplatis en dessus et portant près de leur suture une rangée de petites granulations. L'angle spiral du dernier est saillant et fortement caréné: toute sa surface est traversée par de larges sillons dans l'intervalle desquels se dessinent des séries de tubercules assez saillants et arrondis. La coquille est brunâtre avec des parties blanches ou cendrées et comme nébuleuses. Les tubercules sont blancs.

Long. 20 millim.

Habite

Cette jolie espèce est surtout remarquable par les sillons qui la traversent et les rangées de tubercules qui entrecroisent ces sillons.

96. CÔNE DE REEVE. *Conus Reevei*, NOBIS.

(Collect. de M<sup>me</sup> DUPONT.) REEVE, *Conch. icon.* pl. 24,  
fig. 133 b.

Pl. XLIV, fig. 2.

C. testâ conicâ, crassâ, apice ventricosâ, basim versus angustatâ, reticulatim striatâ; spirâ obtusâ, maculis brunneis albisque vicissim distinctâ; ultimo anfractu confertissimè lineato, ad medium albo-fasciato.

Coquille conique, épaisse, bombée à son extrémité supérieure, légèrement arrondie vers la naissance de la spire et rétrécie à sa base. La spire est peu élevée, obtuse, composée de neuf ou dix tours étroits, médiocrement aplatis. L'ouverture est étroite, d'un blanc rosé. Cette coquille est couverte d'un grand

116

GENRE CÔNE.

nombre de fines stries longitudinales et transverses dont l'entre-croisement forme un réseau extrêmement serré. Le dernier tour, quelquefois de couleur olivâtre, est traversé dans toute son étendue par un grand nombre de lignes également distantes entre elles, plus saillantes vers la base de la coquille. Ces lignes sont formées de petits points allongés très-rapprochés entre eux et d'un fauve foncé. Une étroite fascie blanche, pointillée de même, est placée un peu au-dessous du milieu du dernier tour. La spire est marquée de larges taches d'un brun foncé, alternant avec d'autres taches blanches à peu près égales.

Long. 46 millim.

#### Habite

Ce Cône a été signalé pour la première fois par M. Reeve qui l'a indiqué comme variété du *C. punctatus*, en proposant de le réunir au *C. hyana*. Pour nous, ces deux espèces sont bien distinctes l'une de l'autre et ne peuvent être confondues. Le Cône auquel nous avons donné le nom de M. Reeve est une coquille bien différente du *C. punctatus* de Bruguières : il en est distinct, au premier aspect, en ce que la spire n'est jamais couronnée.



**232. CÔNE ROSACÉ.** *Conus rosaceus*, NÖBIS.

(Collect. de M. GUBBA.)

Pl. CVII, fig. 4.

*C.* testâ turbinatâ, conicâ, ad basim subcoarctatâque recurvatâ, infernè sulcatâ, sulcis duodecim, latis; cinereâ, maculis roseis albisque irregularibus nebulosâ, obscurè bifasciatâ; spirâ elatâ, acuminatâ; ore roseo.

Coquille turbinée, régulièrement conique, offrant vers sa partie inférieure un léger rétrécissement suivi d'une faible inflexion dorsale. La spire est assez élevée, elle forme environ le quart de la longueur totale. Elle est un peu étagée, conique et très-acuminée; on y compte dix tours aplatis en dessus et portant quelques stries décurrentes très-fines. Toute la moitié supérieure du dernier tour est lisse, l'autre moitié est pourvue de douze gros sillons transverses espacés entre eux. L'ouverture est étroite, les bords en sont à peu près parallèles; le bord droit, mince et tranchant, offre vers sa partie supérieure une échancrure bien marquée. La coloration consiste en des taches irrégulières jaunâtres se détachant sur un fond blanc ou rosé. En outre, on distingue encore sur le fond d'autres petites taches d'un blanc mat formant deux sortes de fascies transverses vaguement indiquées. La spire est marquée de taches brunes et blanches. L'ouverture est rose dans l'intérieur.

Long. 26 millim.

Habite

Cette jolie espèce est remarquable par son aspect nébuleux dû aux différentes sortes de taches dont elle est ornée. C'est par erreur qu'elle est indiquée sur notre planche 107, fig. 4, sous le nom de *C. roseus*.

**16. CONE ROSÉ.** *Conus roséus*, LAM.

(Collect. LAM. et MUS.) MARTINI, *Conch.* 2, t. 63, fig. 707.

Pl. IX, fig. 3.

C. testâ turbinatâ, coronatâ, transversim sulcatâ, roséâ, fuscis sparsim punctis; fasciâ albidâ; apice obtusâ.

Coquille turbinée, épaisse, large et convexe à sa partie supérieure, étroite et resserrée à sa base. La spire est obtuse, peu élevée, formée de sept ou huit tours légèrement concaves, ornés de stries décourbées et surmontés d'une rangée de tubercules obtus; le dernier tour est traversé par des sillons assez forts,

GENRE CÔNE.

25

surtout vers la base. La coloration consiste en une teinte générale rosée. La coquille est traversée d'une fascie blanchâtre; une même fascie couronne l'angle de la spire; la surface est en outre parsemée de petits points noirs ou bruns; dans l'intervalle des tubercules, la spire est tachetée de brun; la base de la columelle est colorée de brun pourpre.

Long. 40 millim.

Habite les mers des Antilles.

Cette espèce, très-voisine du *Conus mus*, en est distincte par sa forme moins renflée, sa spire moins élevée, et enfin parce que les sillons qui la traversent ne sont point chargés de granulations. En outre, sa coloration rose piquetée de brun et la teinte foncée de la base de la columelle établissent également des différences entre les deux coquilles. M. Reeve, dans son *Conchol. icon.*, a fait représenter un *Conus lividus* var., pour le *Conus roséus* de Lamarck.

**319. CONE SANGUIN.** *Conus sanguineus*, NOBIS.

(Collect. de M. VERREAUX.)

Pl. CXI, fig. 2.

C. testâ pyramidali turbinatâ, incrassatâ ; rubro-sanguinolentâ, maculis pal-  
lidis irregularibus elongatisque angulatis, in tribus fasciatis dispositis ornatâ ; li-  
neis transversis punctorum nigrorum articulatis omninè instructâ ; spirâ bre-  
viore subcontabulatâ, granulis obsoletis coronatâ.

Coquille turbinée, pyramidale. La spire est conique,  
un peu élevée; on y compte trois tours étroits : les

GENRE CÔNE.

357

premiers sont légèrement anguleux et munis d'une  
rangée de tubercules peu prononcés ; le dernier est  
aplati, excavé en dessus ; son angle spiral est obtus.  
Toute la surface est lisse, à l'exception du canal de la  
base qui présente quelques sillons obliques. La colora-  
tion consiste en un fond d'un rouge sanguinolent très-  
vif sur lequel on distingue un grand nombre de lignes  
transverses articulées de très-petits points noirâtres.  
Trois fascies occupent le dernier tour : l'une est placée  
vers l'angle spiral, l'autre vers la partie supérieure  
du canal et enfin la troisième qui est la plus impor-  
tante, est située un peu au-dessous du milieu du tour.  
Ces fascies sont formées de la réunion de grandes ma-  
culations blanchâtres, très-irrégulières, allongées, an-  
guleuses et quelquefois trigones.

Long. 44 millim.

Habite

Cette belle espèce est extrêmement voisine du *Conus archon* ; elle a  
à peu près l'ensemble des caractères de ce dernier Cône, mais elle en  
diffère par quelques nuances ; sa forme est moins pyramidale, sa spire  
un peu étagée ; ses premiers tours sont obscurément couronnés ; enfin  
sa coloration présente des taches moins nombreuses et moins dissé-  
minées.

314. **CONE RABOTEUX.** *Conus scaber*, NOBIS.

(Collect. de M. BERNARDI.)

Pl. C, fig. 1.

*C. testâ inflato-turbinatâ, crassâ, basi angustâ; spirâ exsertâ, conico-mucronatâ, tuberculis crassis coronatâ, circuliter striatâ; ultimo anfractu tuberculis moniliformibus albis per seriibus transversis dispositis ornatâ; aurantiâ, lineolisque punctibus reticulatis obscure fasciatâ.*

Coquille turbinée, épaisse, renflée au milieu, atténuée et rétrécie à sa partie inférieure. La spire, médiocrement élevée, est couronnée par une rangée de gros tubercules obtus. L'angle spiral du dernier tour est bien prononcé; presque toute la surface de ce tour est ornée de séries transversales de petits tubercules moniliformes très-réguliers et d'un blanc lacté : ces

352

GENRE CÔNE.

tubercules tranchent ainsi sur le fond de la coquille, formée d'un grand nombre de linéoles orangées, constituant une sorte de réseau irrégulier qui circonscrit de petits espaces blanchâtres.

Long. 28 millim.

Habite les mers de l'Océanie.

M. Reeve, qui a mentionné cette espèce d'après nos figures, la rapporte cependant à titre de variété au *Conus miliaris*. Malgré l'analogie de forme qui existe entre ces deux espèces, il est évident qu'elles présentent des différences assez importantes pour être classées distinctement. Ainsi, dans notre *C. scaber*, les tubercules de la spire sont plus prononcés, la forme est moins élargie, la surface couverte de granulations moniliformes; enfin, le système de coloration est tout à fait différent en ce sens qu'il est constitué par un réseau de linéoles orangées, tandis que dans le *C. miliaris*, il est formé de lignes ponctuées.



**193. CÔNE ÉTOILÉ.** *Conus stellatus*, NOBIS.

( Collect. de M. BERNARDI. )

Pl. XCIX, fig. 5.

C. testâ turbinatâ, subcylindricâ; fuscâ, lineis tenuissimis reticulatis passim obscuris ornatâ; spirâ convexâ, apice mucronatâ.

Coquille subcylindrique, légèrement renflée, à angle spiral arrondi et obtus. La spire est un peu élevée, arrondie et mucronée au sommet; toute la surface est lisse, à l'exception du tiers inférieur qui porte une douzaine de stries transverses parallèles très-fines. La coloration consiste en un fond d'un brun foncé, sur lequel se détache un réseau de linéoles extrêmement fines, peu distinctes, dans certains endroits, du fond lui-même, et laissant voir, dans d'autres parties, des taches blanches un peu plus grandes et irrégulièrement triangulaires. La spire offre le même système de coloration, mais un peu plus foncé, excepté cependant sur son sommet dont la teinte est plus claire. L'ouverture est blanche dans l'intérieur.

Long. 20 millim.

## Habite

Cette charmante petite espèce a beaucoup d'analogie avec le *Conus mercator*; elle est cependant plus petite; sa forme est un peu plus allongée, et le réseau qui l'enveloppe est beaucoup plus fin et ne forme pas de fascies transverses.

**233. CONE STRIOLÉ.** *Conus striolatus*, NOBIS.

( Collect. de M. BERNARDI. )

Pl. CV, fig. 1.

C. testâ turbinatâ, turgidulâ, ad basim coarctatâ; albâ, in medio bifasciatâ, fasciis luteis, alterâ canali circumdatâ; striis transversalibus numerosis et punctulatis ornatâ, basi mucrosulcatâ; spirâ inflatâ, striis decurrentibus sculptâ, apice mucronato roseo.

Coquille épaisse, turbinée, à peine conique, à plans latéraux, légèrement convexes, formant vers la partie inférieure un étranglement bien marqué. La spire, médiocrement élevée, est renflée et mucronée au sommet; on y compte six tours pourvus en dessus de stries fines et décurrentes; le dernier est légèrement creusé en gouttière; tout le reste de sa superficie est traversé par des stries fines et rapprochées entre elles, articulées de petits points noirs. La base présente quatre ou cinq gros sillons obliques. La coquille est toute blanche avec deux fascies étroites jaunâtres, placées vers le milieu du dernier tour; une autre fascie plus large entoure le canal; sa spire est blanche, son sommet est coloré de rose.

Long. 28 millim.

Habite

GENRE CÔNE.

267

Petite espèce très-remarquable par sa forme peu conique, mais surtout par les stries fixes et pointillées dont sa surface est ornée.

**211. CONE SUBULÉ.** *Conus subulatus*, NOBIS.

( Collect. de M<sup>me</sup> DUPONT. )

Pl. LXX, fig. 2.

C. testâ turbino-elongatâ, subfusiformi ad basim inflexâ; spirâ elatâ, acuminatâ, circiter striatâ; ultimo anfractu supernè angulato, sulcis latis ornato, inferioribus creberrimis; albâ, maculis fuscis quadrangularibus sparsis; aperturâ infernè dilatâtâ, intûs violacèâ.

Coquille allongée, subfusiforme, légèrement infléchie ou rétrécie vers la partie inférieure. La spire est très-élevée, acuminée et pointue ; on y compte douze tours aplatis et ornés de quelques stries décourantes ; l'angle spiral du dernier est bien marqué ; toute son étendue est couverte de larges sillons transverses moins prononcés vers la partie supérieure, mais devenant plus rapprochés et cancellés vers la base ; l'ouverture est un peu dilatée à sa partie inférieure, le bord droit tranchant et sinueux est fortement échancré à son sommet. La coquille offre sur un fond blanchâtre des taches brunes éparses, peu nombreuses, le plus souvent quadrangulaires, mais occupant presque toujours l'intervalle des sillons. La spire est ornée de taches

244

GENRE CÔNE.

semblables, mais plus petites et tout à fait irrégulières. L'ouverture est violette en dedans.

Long. 54 millim.

Habite

Jolie espèce d'une forme très-clancée et comme flexueuse, remarquable par les larges sillons qui couvrent sa surface et les taches quadrangulaires qui y sont mêlées.

**107. CÔNE SOUFRÉ.** *Conus sulphuratus*, NOBIS.

(Collect. de M. BOIVIN et du Mus.)

Pl. LXVI, fig. 3, et pl. LXXVIII, fig. 4.

C. testâ conicâ, turbinatâ, obsoletè striatâ, sulphuratâ, seriatim fusco-maculatâ; spirâ obtusâ, depressiusculâ; ultimo anfractu supernè lævigato; aperturâ flavescence-albidâ.

Coquille petite, conique, assez mince, à spire obtuse, peu élevée, composée de huit ou neuf tours faiblement aplatis, marqués de plusieurs stries circulaires. La moitié supérieure du dernier est lisse; sa partie inférieure présente des stries transverses régulièrement espacées entre elles, peu apparentes, mais se rapprochant et devenant plus distinctes vers la base. L'ouverture est blanche, nuancée de jaunâtre; son échancrure supérieure est arrondie et peu profonde. La couleur de cette coquille est d'une belle couleur de soufre; une série circulaire de petites taches brunes arrondies ou oblongues se détache sur le milieu du dernier tour; des taches semblables, mais beaucoup plus grandes, ornent les tours de spire.

Long. 28 millim.

Habite

Cette jolie petite espèce, que nous a communiquée M. Boivin, paraît se rapprocher du *Conus mustelinus* avec lequel on pourrait même la confondre; tout au moins on pourrait la considérer comme un jeune individu de ce dernier, ainsi que l'a déjà fait M. Sowerby dans son *Concholog. illustr.*, fig. 77. Cependant elle en est distincte par sa forme



322. **CONE DE TASLÉ.** *Conus Taslei*, NOBIS.

(Collect. de la SOCIÉTÉ DE VANNES.)

Pl. CX, fig. 5.

C. testâ turbinato pyriformi, supernè inflatâ, infernè valdè attenuatâ; lutescente, fasciis lividisque albis cinctâ; spirâ conicâ, mucronatâ; fauce violacescente, albo-bifasciatâ.

Coquille turbinée, pyriforme, renflée vers sa partie supérieure, fortement atténuée à sa base. La spire est un peu élevée, conique, mucronée au sommet; on y compte sept ou huit tours étroits, lisses en dessus; l'angle spiral du dernier est arrondi et renflé; ce tour porte à sa base une douzaine de petits sillons obliques. La coquille a une teinte générale d'un jaune verdâtre ou livide; elle est traversée par deux fascies blanchâtres dont l'une est située un peu au-dessous du milieu du dernier tour et l'autre près de l'angle spiral. La spire est généralement brunâtre. L'ouverture est d'un violet foncé dans l'intérieur avec deux traces de fascies blanches sur le bord droit qui correspondent à celles de l'extérieur.

Long. 52 millim.

Habite

C'est avec notre *Conus olivaceus* que cette espèce a le plus d'analogie; son mode de coloration, surtout, est bien semblable, mais sa forme plus renflée vers la partie supérieure et en même temps plus atténuée à sa base, l'en distingue aisément.

**297. CÔNE TEXTILIN.** *Conus textilinus*, NOBIS.(Collect. de M<sup>me</sup> DUPONT.)

Pl. CIII, fig. 5.

C. testâ pyramidatâ, basi attenuatâ; albâ, maculis trigonis passim minutissimis imbricatis ornatâ; lineis longitudinalibus fuscis in fundo aurantio subfasciatâ; spirâ breviorè, conico-mucronatâ.

Coquille turbinée, pyramidale, élargie à sa partie supérieure, vers l'angle spiral, atténuée à sa base. La spire est peu élevée, conique, un peu convexe et mucronée au sommet. Les tours sont au nombre de huit; ils sont légèrement convexes en dessus et pourvus de stries décourantes; le dernier est un peu concave; son angle spiral est bien marqué; ses plans latéraux sont à peu près rectilignes; la base du canal offre quelques stries obliques extrêmement fines. La coquille est couverte en grande partie d'un réseau très-fin de linéoles brunes entourant de petites taches trigones d'un blanc rosé: le fond apparaît çà et là de couleur orangée, avec des lignes longitudinales brunes assez larges et espacées entre elles.

Long. 40 millim.

**Habite**

Cette espèce se rapproche beaucoup du *Conus textile*, au moins par la coloration; cependant son réseau est généralement plus fin et plus étendu, sa forme est aussi assez différente; elle est toujours plus petite, plus pyramidale, plus élargie vers la spire, et ses plans latéraux sont presque rectilignes, tandis que dans l'espèce citée ils sont toujours convexes.

179. CÔNE ONDÉ. *Conus undatus*, NOBIS.

(Collect. de M. DELESSERT.)

Pl. XCIV, fig. 1.

C. testâ turbinatâ, supernè inflatâ, transversim sulcatâ; albidâ, flammulis castaneis undatis vividè pictâ; spirâ elatâ, acuminatâ, fusco variegatâ.

Coquille turbinée, très-élargie vers sa partie supérieure, atténuée et rétrécie à l'inférieure, à plans latéraux très-convexes. La spire est fort élevée, conique, acuminée et pointue vers son sommet; elle est formée de dix tours environ, étroits et aplatis; le dernier est légèrement aplati au-dessous de l'angle spiral qui est saillant et bien marqué. Sa superficie est traversée par des sillons qui deviennent plus rares et disparaissent même quelquefois sur le tiers supérieur de la coquille. La coloration consiste en un fond blanchâtre sur lequel se détachent de grandes maculations longitudi-

GENRE CÔNE.

211

nales assez larges, irrégulièrement contournées, et se transformant en zigzags sur la partie supérieure de la coquille; elles sont interrompues vers la base, et deviennent plus régulièrement parallèles. La spire est également maculée de brun.

Long. 32 millim.

Habite l'océan Indien.

Jolie espèce qui rappelle un peu par sa forme le *Conus sinensis* mais qui en diffère par ses sillons transverses, ainsi que par ses grandes flammules longitudinales brunes se détachant d'une manière bien nette sur le fond blanchâtre de la coquille.

M. Reeve a commis une erreur dans son *Coach. icon. pl. 27, fig. 158*, en prenant cette coquille pour le *Conus cingulatus* de Lamarck.

**323. CÔNE UNIBANDE.** *Conus unifasciatus*. NOBIS.

(Collect. de la SOCIÉTÉ DE VANNES.)

Pl. CX, fig. 4.

C testâ oblongo-turbinatâ, ovoïdê; fusco-castaneâ, infernè obscurè, transversim lineolatâ, supernè albo zonatâ; spirâ elatâ, conicâ, apice mucronato albescente; fauce violacê, albo unifasciatâ.

Coquille turbinée, oblongue, ovoïde, un peu renflée. La spire est conique, assez élevée et mucronée au sommet. Les tours, au nombre de huit, sont étroits et lisses en-dessus ; le dernier est arrondi vers son angle spiral, il porte à sa base et sur le canal quelques stries obliques très-fines. La coquille est d'un brun foncé ou marron, avec une fascie blanchâtre qui occupe la partie supérieure du dernier tour. La coloration brune est en partie composée de lignes transverses; mais, prenant une teinte plus foncée en quelques endroits, elle semble produire de véritables fascies. Le sommet de la spire est blanchâtre. L'ouverture est d'un brun violacé avec la trace de la fascie externe sur le bord droit.

Long. 24 millim.

Habite

Cette jolie petite espèce par sa forme a la plus grande analogie avec certaines variétés du *Conus mercator*; cependant sa spire est plus allongée et sa coloration brune, presque uniforme, sans trace de réseaux la rendent aussi facilement distincte de ce dernier Cône.

**222. CÔNE MOUCHETÉ.** *Conus variegatus*, NOBIS.

(Collect. de M. LARGILLIERT.)

Pl. CVI, fig. 1-1a.

C. testâ turbinatâ, supernè inflatâ, ad basim coarctatâ, transversim sulcatâ; fuscâ vel luteâ, maculis albis minimis irregularibus sparsis, spirâ obtusâ, apice mucronato.

Coquille turbinée, obtuse et renflée vers sa partie supérieure, atténuée et rétrécie à sa base. La spire est surbaissée, mucronée au sommet; l'angle spiral du dernier tour est arrondi et obtus, toute la surface de ce tour est couverte de sillons transverses; ceux de la partie inférieure sont un peu plus espacés entre eux. La coquille est le plus souvent d'un brun foncé avec de petites taches ou des points blancs irrégulièrement épars; d'autres fois elle est fauve avec des séries de petits points bruns correspondant aux sillons transverses; l'angle spiral est articulé de petites taches alternativement brunes et blanches.

Long. 25 millim.

**Habite**

Petite espèce fort jolie, qui offre beaucoup d'analogie avec notre *Conus africanus*, mais qui en est distincte par sa forme plus atténuée vers sa base, et surtout par les sillons qui la traversent. Sa coloration est également très-différente; les taches sont beaucoup moins grandes. La variété fig. 1<sup>a</sup> est plus petite, et est remarquable par un fond de coloration d'un fauve clair; les séries de points transverses y sont aussi plus marquées.



**313. CONE DE VAUTIER.** *Conus Vautieri*, NOBIS.

( Collect. de M. BERNARDI. )

Pl. G, fig. 3.

C. testâ turbinatâ, subinflatâ, solidâ, lævigatâ, basi sulcatâ; albâ, rosoque fusconebulosâ, punctis fuscis vel nigris sparsim ornatâ; spirâ plano-depressâ, tuberculis crassis coronatâ.

Coquille turbinée, épaisse, légèrement renflée, à spire plane, déprimée, dont les tours assez nombreux sont couronnés par une série de gros tubercules coniques. L'angle spiral du dernier est bien prononcé; presque toute l'étendue de ce tour est lisse, sa base

GENRE CÔNE.

351

seulement est garnie de quelques sillons obliques assez distants entre eux. La coloration consiste en un fond blanchâtre nuagé de rose et de brun, sur lequel se détachent un grand nombre de points bruns ou noirs, irrégulièrement épars, quelquefois agglomérés, principalement sur les parties nuagées de brun.

Long. 52 millim.

Habite

Cette espèce est voisine du *Conus pulicarius*, mais en est distincte par plusieurs caractères importants, surtout par l'aplatissement plus considérable de la spire et par le plus grand développement des tubercules, enfin par ses points bruns plus nombreux et accompagnés de nébulosités. Nous avons dédié cette espèce à M. Vautier, amateur zélé qui habite le Calvados.

**217. CÔNE DE VERREAUX.** *Conus Verreauxii*, NOBIS.

(Collect. VERREAUX.)

Pl. LX, fig. 5.

C. testâ ovato-turbinatâ, subinflatâ, subtilissimè transversim striatâ, basi sex latisulcatâ; luteâ, transversim fasciatâ, maculis fuscis angulatisque irregularibus ornatâ.

Coquille turbinée, ovale, un peu renflée, à plans latéraux convexes. La spire est peu élevée, conique et pointue; les tours, au nombre de neuf ou dix, sont aplatis et striés; l'angle spiral du dernier est ar-

250

GENRE CÔNE.

rondi et obtus. Toute la surface est couverte de stries extrêmement fines et rapprochées entre elles. Vers la base, on observe six larges sillons distants entre eux. Le fond de coloration est d'un jaune de soufre assez vif avec des taches brunes irrégulières, anguleuses, interrompues un peu au-dessous du milieu de la coquille, et qui laissent voir le fond comme une fascie transverse à cet endroit. La spire offre des maculations à peu près semblables.

Long. 40 millim.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.

Cette jolie espèce est remarquable par les stries extrêmement fines dont sa surface est ornée, et par sa coloration d'un jaune de soufre. Elle a cependant, malgré ces différences, une légère analogie avec le *Conus anemone*.



**224. CÔNE ZÉBROÏDE.** *Conus zebroïdes*, NOBIS.

(Collect. de M. LARGILLIERT.)

Pl. CV, fig. 5

C. testâ turbinatâ, supernè inflato-turgidâ, ad basim attenuatâ; fulvâ, lineis fuscis longitudinalibusque flexuosis pictâ; spirâ brevi, obtuso-convexâ; apice mucronato.

Coquille turbinée, large et renflée vers sa partie supérieure, atténuée à sa base qui présente un léger étranglement. La spire est convexe et peu élevée; on y compte six tours lisses et arrondis; l'angle spiral du dernier est très-obtus; toute sa surface est lisse, excepté sa base qui offre une douzaine de stries obliques peu marquées. La coloration, très-élégante, consiste en un fond jaunâtre clair, sur lequel se détachent de grandes lignes brunes longitudinales, un peu flexueuses, zébrant toute l'étendue du dernier tour; la spire est pourvue des mêmes lignes, mais elles y sont plus fines.

17

258

GENRE CÔNE.

Long. 45 millim.

Habite

Jolie coquille, très-remarquable par les grandes lignes brunes dont elle est zébrée; sa forme élargie et obtuse à sa partie supérieure la rendent également facile à distinguer de ses congénères. C'est encore à l'obligeance de M. Largilliert que nous devons la connaissance de cette intéressante espèce.



- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cône ponctué.            | ( <i>Conus punctatus</i> . Brug.) |
| 2. Cône livide.             | ( <i>Conus lividus</i> . Brug.)   |
| 2 <sup>a</sup> id: id: var: | ( id: id: var: )                  |
| 3. Cône rosé.               | ( <i>Conus roseus</i> . Lam.)     |

1.



1.<sup>a</sup>



4.



2.



3.



5.



1.<sup>b</sup>



1.<sup>c</sup>



1. Cône papier-turc.
- 1.<sup>a</sup> à 1.<sup>c</sup> id: var:
2. Cône émaillé.
3. Cône cardinal.
4. Cône époux.
5. Cône chingulais.

- (*Conus minimus*. Lin.)  
 (id: id: var: )  
 (*Conus encaustus*. nobis)  
 (*Conus cardinalis*. Brug)  
 (*Conus sponsalis*. Brug)  
 (*Conus ceylanensis*. Brug)



2.



1.



1.



3.



1. Cône allongé.

*(Conus elongatus Reeve)*

2 Cône linée var:

*(Conus quercinus var)*

3. Cône acajou.

*(Conus badius. nobis.)*

1.



2.



5.



3.



5<sup>a</sup>



4.



1. Cône d'Adamson..

2. Cône de Reeve .

3. Cône rat .

4. Cône pyriforme .

5. Cône spectre .

5<sup>a</sup> id: id: jeune .

(*Conus Adamsoni* Brod.)

(*Conus Reevei* . nobis.)

(*Conus rattus* . Brug.)

(*Conus pyriformis* . Reeve)

(*Conus spectrum* . Lin.)

( id: id: junior.)



- 1. Cône Lorenz.
- 2. Cône Andaloux.
- 3. Cône rayé.
- 4. Cône jaspé.
- 5. Cône de Caillaud.
- 6. Cône cheville.
- 7. Cône nain.

- (*Conus Lorenxianus*. Chemn.)
- (*Conus Bæticus*. Reeve.)
- (*Conus scalptus*. Reeve.)
- (*Conus jaspideus*. nobis.)
- (*Conus Caillaudi*. nobis.)
- (*Conus epistomium*. Reeve.)
- (*Conus pusillus*. Chemn.)





1. Cône méditerranéen. (*Conus mediterraneus*. Brug.)  
 1.<sup>a</sup> à 1.<sup>f</sup> id: id: var: ( id: id: var: )  
 2. Cône de Bruguières. (*Conus Bruguièresi*. nobis)





Maubert pinx.

Piroel sc.

- 1. Cône agréable.
- 1<sup>a</sup> id: id: var:
- 2. Cône alvéole.
- 3. Cône pluie d'argent.
- 4. Cône épervier.
- 5. Cône toupie.
- 6. Cône Citrin.

- (*Conus pulchellus* Swains.)
- ( id: id: var: ... )
- (*Conus alveolus*. Sow. )
- (*Conus mindanus*. Brug. )
- (*Conus nisus*. Chemn.)
- (*Conus tornatus*. Brod.)
- (*Conus Citrinus*. nobis.)



1.<sup>b</sup>



2.



2.



5.



3.



4.



- 1. Cône pointillé.
- 1.<sup>a</sup> 1.<sup>b</sup> id: id: var:
- 2. Cône de Martini.
- 3. Cône albâtre.
- 4. Cône lacté.
- 5. Cône de Verreaux.

- (*Conus puncticulatus*. Brug)
- ( id: id: var:
- (*Conus Martinianus*. Reeve)
- (*Conus Parvus*. Reeve)
- (*Conus lacteus*. Lam.)
- (*Conus Verreauxii*. nobis.)





1. Cône ambassadeur.

(*Conus linianus*. Brug.)

2. Cône de Dupont.

(*Conus Dupontii*. nobis)

3. Cône pourpré var.

(*Conus purpurascens* var.)

4. Cône unicolor.

(*Conus unicolor*. Sow.)



Mudbert pins.

Piroel se.

- 1. Cône turban.
- 1<sup>a</sup> id: id: var:
- 2 Cône grisâtre.
- 5. Cône matelot.
- 4. Cône brillant.
- 4<sup>a</sup> id: id: var:
- 5. Cône cerclé.

- (*Conus cidaris nobis*)
- (*id: id: var:*)
- (*Conus griseus nobis*)
- (*Conus clavarius Brug*)
- (*Conus nitidus. Luce*)
- (*id: id: var:*)
- (*Conus vittatus Brug*)



1.



1.



1.<sup>a</sup>



2.



2.



1. Cône Elisa.

(*Conus Elisa nobis*)

1.<sup>a</sup> id: id: jeune.

(*id: id: junior.*)

2. Cône de Boivin.

(*Conus Boivini nobis*)



1. Cône de Lorois.

(*Conus Loroisii nobis*)

2. Cône Cylindraccé.

(*Conus Cylindraccus. Brod.*)

1.



2.



6.



3.



3.



6<sup>a</sup>



4.



5.



- 1. Cône chevalier.
- 2. Cône spleen.
- 3. Cône soufré.
- 4. Cône violet.
- 5. Cône réticulé.
- 6. Cône variolé.
- 6<sup>a</sup> id: id: var:

- (*Conus eques.* Brug.)
- (*Conus tabidus.* Reeve.)
- (*Conus sulphuratus.* nobis.)
- (*Conus tailensis.* Brug.)
- (*Conus reticulatus.* Sow.)
- (*Conus verrucosus.* Brug.)
- (*id: id: var:.*)




1.



2.




5.



3.



4.



Maubert pinx.

Froid. sc.

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Cône veiné.        | ( <i>Conus venulatus.</i> Brug.)      |
| 2. Cône chiné var.    | ( <i>Conus mauritianus</i> var. Lam.) |
| 3. Cône agathe var.   | ( <i>Conus achatinus</i> var. )       |
| 4. Cône de madelaine. | ( <i>Conus magdalenae.</i> Chenu.)    |
| 5. Cône véruleux.     | ( <i>Conus verulosus.</i> Brug.)      |

2.

2.



1.

3.

3.



4.

4.



1. Cône changeant.

(*Conus mutabilis*. Chemn.)

2. Cône subulé.

(*Conus subulatus*. nobis)

3. Cône ambigu.

(*Conus ambiguus*. Reeve)

4. Cône pagode.

(*Conus pagodus*. Chemn.)

1.



1.



5.



2.



6.



3.



7.



4.



4.



1. Cône acutangle.
2. Cône muriculé.
3. Cône chétif.
4. Cône papilleux.
5. Cône arqué.
6. Cône sillonné.
7. Cône iodostome.

- (*Conus acutangulus*. Chemr.)  
 (*Conus muriculatus*. Sow.)  
 (*Conus pauperculus*. Sow.)  
 (*Conus papillosus*. nobis)  
 (*Conus arcuatus*. Brod.)  
 (*Conus exaratus*. Reeve)  
 (*Conus iodostomus*. Reeve)





1. Cône hiéroglyphique.  
 1<sup>a</sup> id. id. var:  
 2. Cône corallin.  
 3. Cône jaune.  
 3<sup>a</sup> id. id. var:  
 4. Cône rouge.  
 5. Cône consort.

Barbier pinx.

- (*Conus hiéroglyphicus* DuRoi.)  
 ( id. id. var. )  
 (*Conus corallinus*. nobis )  
 (*Conus luteus*. Brod. )  
 ( id. id. var. )  
 (*Conus rutilus*. Menke )  
 (*Conus consors*. Sow. )  
 Prod. 10



- 1. Cône hybride.
- 2. Cône tacheté de blanc.
- 3. Cône velours.
- 4. Cône de Lamarck.
- 5. Cône radis var.

- (*Conus hybridus*. nobis.)
- (*Conus albinaculatus*. Sow.)
- (*Conus luxonicus*. Brug.)
- (*Conus Lamarckii*. nobis.)
- (*Conus raphanus*. var.)

Maubert pinx.

Publié par J. B. Baillière et fils. Paris.

Pireod sc.





1. Cône Cerf.
2. Cône Aplustre.
3. Cône Mahogany.
4. Cône de Gabriel.

(*Conus Cervus*. Linn.)  
 (*Conus Aplustre*. Bonn.)  
 (*Conus Mahogany*. Bonn.)  
 (*Conus Gabriellii*. Cuv.)





Muséum de Paris

- 1. Cône mucroné.
- 2. Cône jaunâtre.
- 3. Cône petit-coin.
- 5. id: id: var:
- Cône aculeiforme.

- (Conus mucronatus. Reuss)
- (Conus flavescens Gray)
- (Conus cuneolus. Reuss)
- (id: id: var:)
- (Conus aculeiformis Reuss)
- (Conus Septentrio Reuss)

Planch. 92.

acuminata  
 ...



1. Cône ondulé.
2. Cône de Clerg.
3. Cône émule.
4. Cône suaire.
5. Cône artopte.

- (Conus undatus. nobis)  
 (Conus Clerg. Rowe)  
 (Conus amulus. Rowe)  
 (Conus sindan. Rowe)  
 (Conus artoptus. Sow)  
 (Conus gradatus. Gray)



1. Cône candide.  
 2. Cône dactyle.  
 3. Cône hépatique.

(*Conus candidus*. nobis)

(*Conus dactylus*. nobis)

(*Conus hepaticus*. nobis)

(*Conus incurvus*. Brod.)





1 Cône chagriné.

2 Cône de Philippi.

(*Conus granarius*, nobis)

(*Conus Philippi*, nobis)

(*Conus Largillierii*, nobis)



1. Cône crétacé.



2. Cône ciselé.

3. Cône étoilé.

(*Conus cretaceus*, nobis)

(*Conus inscriptus*, nobis)

(*Conus stellatus*, nobis)



1. Cône raboteux.  
2. Cône de Bernardi.

(*Conus scaber*, nobis.)

(*Conus Bernardi*, nobis.)

(*Conus Vautieri*, nobis.)





1<sup>a</sup>, 1<sup>b</sup> Cône de Largillier var.

2. Cône pustulé.

3. Cône disséminé.

(*Conus Largillieri* var.)


(*Conus pustulatus* nobis)

(*Conus dispar* Sw.)



1. Cône de Michels  
 2. Cône labouré  
 3. Cône hiéroglyphique var.  
 4. Cône de Paros var.

- (*Conus Michelsi* nobis)  
 (*Conus latus* Anna)  
 (*Conus hiéroglyphicus* var.)  
 (*Conus Paros* var.)



1. Cône Gubba.

2. Cône africain.

3. Cône marron.

4. Cône magistrat.

(*Conus Gubba. nobis*)

(*Conus africanus nobis*)

(*Conus castaneus nobis*)

(*Conus archon. Brod.*)



1. Cône striolé.
2. Cône échinulé.
3. Cône écrit.
4. Cône truite.

- (*Conus striolatus* nobis)  
 (*Conus echinulatus* nobis)  
 (*Conus inaeptus* Röve)  
 (*Conus guttatus* nobis)  
 (*Conus zebraeoides* nobis)





1. Cône moucheté.  
 1<sup>re</sup> id. id. var.  
 2. Cône blondin var.  
 3. Cône floconneux.

(*Conus variegatus* nobis)  
 ( id. id. var. )  
 (*Conus flavidus* var. )  
 (*Conus floccatus* Sow.)





1. Cône tacheté d'écarlate.  
 1<sup>a</sup> id. id. var.  
 2. Cône de Cibiel.  
 3. Cône de Cécile var.

( *Conus Coccineus* *Rome* )  
 ( id. id. var. )  
 ( *Conus Cibielii* *nobis* )  
 ( *Conus Cécilei* var. )



1. Cône ardoisé

2. Cône laciné

3. Cône Pauline

4. Cône denté

( *Conus ardiaciense* nobis )

( *Conus lacinatus* nobis )

( *Conus Paulina* nobis )

( *Conus ateralbus* nobis )



1. Cône crénelé .  
2. Cône fascié .

1. *Conus crenulatus* .  
1. *Conus fasciatus* .  
1. *Conus obtusus* .





1. Cône maille
2. Cône de Guinée var<sup>le</sup>
3. Cône de Taslé

(*Conus concentricatus* nobis.)

(*Conus guinaicus* var<sup>no 7</sup>?)

(*Conus Taslei* nobis.)



1. Cône de Blainville  
2. Cône sanguin  
3. Cône olivacé

( *Conus Blainvillii* *nautilus* )  
( *Conus sanguineus* *nautilus* )  
( *Conus olivaceus* *nautilus* )