

HISTOIRE NATURELLE
DES
ANIMAUX SANS VERTÈBRES,

PRÉSENTANT

LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS DE CES ANIMAUX,
LEUR DISTRIBUTION, LEURS CLASSES, LEURS FAMILLES, LEURS
GENRES, ET LA CITATION DES PRINCIPALES ESPÈCES QUI S'Y
RAPPORTENT;

PRÉCÉDÉE

D'UNE INTRODUCTION offrant la détermination des caractères essentiels de l'Animal, sa distinction du végétal et des autres corps naturels; enfin, l'exposition des principes fondamentaux de la Zoologie.

PAR M. LE CHEVALIER DE LAMARCK,

Membre de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de la Légion-d'Honneur, et de plusieurs Sociétés savantes de l'Europe, Professeur de Zoologie au Muséum d'Histoire naturelle.

Nihil extra naturam observatione natum.

TOME - SEPTIÈME.

PARIS,

CHEZ L'AUTEUR, AU JARDIN DU ROI.

Août. — 1822.



42. Cône nain. *Conus pusillus.*

C. testā turbinatā, subcoronatā, albā, maculis aurantio-fuscis variegatā; lineis transversis albo fulvoque articulatis; spirā convexo-acutā; fauce subviolacea.

Conus pusillus. Chemn. Conch. 11. t. 183. f. 1788. 1789.

Conus pusillus. Ann. ibid. n°. 42.

Habite les parages de la Guinée. Mon cabinet. Il est panaché de blanc et d'une couleur orangée plus ou moins brune. Longueur, 9 lignes un quart.

43. Cône exigu. *Conus exiguum.*

C. testā oblongo-turbinatā, coronatā, albā; maculis fuscis longiitudinalibus; striis transversis laxis; spirā convexo-acutā.

Conus exiguum. Ann. ibid. n°. 43.

Habite les mers de l'Asie. Mon cabinet. Petit cône de la forme et de la taille du *C. ceylanensis*, mais offrant d'autres caractères. Il n'a ni zone ni lignes ponctuées, et ses stries transverses sont écartées les unes des autres. Longueur, 8 lignes.

44. Cône rude. *Conus asper.*

C. testā turbinatā, coronatā, transversim sulcatā, albido-luted; sulcis elevatis scabris; spirā convexo-acutā; labro denticulato.

Conus costatus. Chemn. Conch. 11. t. 181. f. 1745—1747.

Conus asper. Ann. ibid. n°. 44.

Habite les mers de la Chine. Ce cône est remarquable par ses sillons transverses, élevés et plus ou moins scabres. Les tours de sa spire sont canaliculés, striés et noduleux.

[*Coquille non couronnée.*]

45. Cône tigre. *Conus millepunctatus.*

C. testā turbinatā, albā, maculis fuscis aut nigris serialim cincta; spirā plano-obtusa: anfractibus subcanaliculatis.

Conus litteratus. Brug. Dict. n°. 38. [Var. i.]

Encyclop. pl. 523. f. 5.

Conus litteratus. Ann. ibid. p. 40. n°. 45.

[b] *Var. testā albā; maculis sublunatis fulvo-cæsiis.*

Martini, Conch. 2. t. 60. f. 666.

Brug. [Var. g.]

Encylop. pl. 323. f. 5.

[c] *Var. testā rubescente; maculis rufis angulatis.*

Favanne, Conch. pl. 18. fig. A 4.

Martini, Conch. 2. t. 60. f. 667.

Brug. [Var. e.]

Encylop. pl. 323. f. 2.

[d] *Var. testā maculis oblongis subquadratis cœruleo-nigris per series transversas scriptā aliisque minoribus punctiformibus seriatim interpositis cinctā.*

Seba, Mus. 3 t. 45. f. 1.

Brug. [Var. d.]

Encylop. pl. 324. f. 4.

[e] *Var. testā maculis fulvis rotundatis notatā; spirā acutiusculā.*

Brug. [Var. c.]

Encylop. pl. 324. f. 3.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Grande et belle coquille, épaisse, pesante, n'ayant jamais de zones colorées, remarquable par ses points nombreux, disposés par séries transverses, sur un fond ordinairement blanc, et par sa spire obtuse, peu élevée. Le bord supérieur du dernier tour est anguleux, ce qui distingue cette espèce du cône tine, qui est tacheté de la même manière, mais autrement coloré. Vulg. le *millepoints*. Long., 4 pouces 2 lignes ; mais il devient beaucoup plus grand.

46. Cône arabe. *Conus litteratus*.

C. testā turbinatā, albā, maculis fuscis aut nigris seriatim cinctā; zonis tribus luteo-aurantiis; spirā planā, truncatā; anfractibus-canaliculatis.

Conus litteratus. Lin. Gmel. p. 5375. n°. 5.

Bonanni, Recr. 3. f. 563.

Gault. Test. t. 21. fig. O.

Favanne, Conch. pl. 18. fig. A 3.

Martini, Conch. 2. t. 60. f. 668.

Conus litteratus. Brug. Dict. n°. 58. [Var. a.]

Encylop. pl. 323. f. 1.

Conus arabicus. Ann. ibid. n°. 46.

Seba, Mus. 3. t. 43. f. 26.
 Knorr, Vergn. 2. t. 8. f. 4.
 Favanne, Conch. pl. 14, fig. H 2.
 Martini, Conch. 2. t. 53. f. 582. 583.
Conus spectrum. Brug. Dict. n°. 122.
Encyclop. pl. 541. f. 9..
Conus spectrum. Ann. ibid. n°. 148.

Habite l'Océan indien, les côtes des Moluques, etc. Mon cabinet.
 Coquille mince, blanche avec des flammes longitudinales flexueuses rousses ou marron. Elle est sillonnée transversalement dans sa moitié inférieure, et est remarquable par son ouverture ample. Longueur, 21 lignes.

150. Cone bullé. *Conus bullatus*.

C. testā cylindraceo-ovatā, miniatā, puniceo et albo variegatā ; spirā canaliculatā, mucronatā; aperturā hiante; fauce aurantiā.
Conus bullatus. Lin. Gmel. p. 3395. n°. 63.
Gmel. Test. t. 26. fig. C.
D'Argenv. Conch. pl. 13. fig. H.
Favanne, Conch. pl. 18. fig. C 8.
 Seba, Mus. 3. t. 43. f. 15. 16.
 Knorr, Vergn. 5. t. 11. f. 4.
 Chemn. Conch. 10. t. 142. f. 1315. 1316.
Conus bullatus. Brug. Dict. n°. 123.
Encyclop. pl. 339. f. 5.
Conus bullatus. Ann. ibid. p. 429. n°. 149.

[b] *Var. lineis puniceo et albo articulatis:*

Encyclop. pl. 339. f. 6.

Habite les mers des grandes Indes, des Moluques et des Philippines.

Mon cab. pour la var. [b]. Coquille ovale-allongée, subcylindracée, dont les couleurs consistent en des mouchetures blanches et poncées sur un fond couleur de minium. Sa var. à cordelettes articulées est très-belle et assez rare. Long. de cette dernière, 2 pouces une ligne.

151. Cone cerf. *Conus cervus*.

C. testā majusculā, cylindraceo-ovatā, tenuī, pallidē luteā; testā transversis inaequalibus fulvo et albo articulatis; spirā breri, subacutā: anfractibus planulatis, striatis; fauce albā.

Habite.... Mon cabinet. Espèce qui me paraît inédite, et néanmoins qui est très-distincte de toutes celles qui sont connues. Ses rapports de forme la rapprochent du cône bullé; mais sa spire ét ses couleurs sont très-différentes. Sa ténuité et sa taille l'avoisinent en quelque sorte du cône brocard; si sa spire était couronnée; le bord droit va en s'atténuant vers sa partie postérieure, et est d'un beau blanc intérieurement. Long., 5 pouces 7 lignes.

152. Cône drap-d'argent. *Conus stercus muscarum.*

C. testā cylindraceo-turbinatā, albā, fusco-maculatā; punctis nigris cingulatis identidem coacervatis; spirā convexo-obtusā, canaliculatā.

Conus stercus muscarum. Lin. Gmel. p. 3385. n°. 23.

Lister, Conch. t. 757. f. 9.

Rumph. Mus. t. 53. fig. Z.

Petiv. Gaz. t. 75. f. 1. et Amb. t. 15. f. 21.

Gault. Test. t. 25. fig. O.

D'Argenv. Conch. pl. 13. fig. E.

Seba, Mus. 3. t. 55. in medio plurimæ absque numero.

Favanne, Conch. pl. 15. fig. F. 4.

Knorr, Vergn. 1. t. 7. f. 5.

Martini, Conch. 2. t. 64. f. 711. 712.

Conus stercus muscarum. Brug. Dict. n°. 113.

Encyclop. pl. 341. f. 6.

Conus stercus muscarum. Ann. ibid. n°. 150.

[b] *Var. punctis rufis.* Mon cabinet.

Knorr, Vergn. 6. t. 16. f. 4.

Martini, Conch. 2. t. 64. f. 713.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Si ce cône était couronné, il serait très-voisin, par ses rapports, du cône piqûre-de-mouches. Longueur, 25 lignes.

153. Cône satiné. *Conus timorensis.*

C. testā cylindraceo-turbinatā, gracili, incarnatā; albo-undatā; zonā obsoletā intermediā; spirā canaliculatā, acuminatā; aperiturā hiante.

Conus timorensis. Brug. Dict. n°. 124.

Encyclop. pl. 341. f. 3.

Conus timorensis. Ann. ibid. n°. 151.

Habite les mers des grandes Indes, des Moluques, les côtes de Timor.

Mon cab. Ce cône est grêle, d'une couleur incarnat ou d'un rose