

689

DOUBLE  
Sp. 8301

# PALÉONTOGRAPHIE

OU DESCRIPTION

## DES FOSSILES NOUVEAUX

du terrain tertiaire marin ou terrain miocène supérieur

DU DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

PAR

M. P.-A. MILLET DE LA TURTAUDIÈRE

Membre de l'Institut des provinces; des Sociétés géologique et paléontologique de France, impériale et centrale d'agriculture de France, française de statistique universelle, fondation de Paris, impériale d'agriculture, sciences et arts d'Angers; de la Commission royale de pomologie belge.  
Président honoraire du Comité horticulture de Maine-et-Loire et de la Société d'horticulture du même département.  
Correspondant des Sociétés: philologique de Paris, philomatique de Normandie, académique de Nantes, d'émulation d'agriculture, lettres, sciences et arts de l'Ain; des Sociétés d'horticulture de la Gironde, du département de Seine-et-Oise, du Mans, d'Ille et Vilaine, etc.  
Membre honoraire des Sociétés: linnéenne de Bordeaux, impériale et centrale d'horticulture, d'horticulture de l'Aube, etc.

ANGERS

LIBRAIRIE DE COSNIER ET LACHÈSE

11, Chaussée Saint-Pierre, 1

1866

36 pp.

partie moyenne, offre une ouverture étroite, dont la longueur est moins grande que celle de la moitié de la coq. entière, ainsi que quatre plis columellaires. Longueur : 50 millimètres ; diamètre : 15-16 millimètres.

Cette espèce a quelque ressemblance de forme avec le *M. elongata*, Lam. qui atteint 10 centimètres de longueur et dont elle n'est peut-être qu'une variété. Th., Sc.

(66) *Mitra fallax*, Millet. Coq. petite, fusiforme, aiguë au sommet ; composée de 8-9 tours de spire presque plans et couverts de fines stries très-rapprochées les unes des autres et qu'on ne peut bien voir qu'à la loupe. L'ouverture, qui présente deux ou trois plis columellaires, égale en longueur le restant de la coq. Longueur : 14-15 millimètres ; diamètre : 5 millimètres. Sceaux.

(67) *Mitra hibryda*, Millet. Coq. petite, fusiforme, composée de 7-8 tours de spire, presque plans, mais bien détachés les uns des autres par une suture très prononcée et couverts de stries élevées, arrondies. L'ouverture, qui présente 2-3 plis columellaires égale à peine en longueur le restant de la coq. Longueur : 10-12 millimètres ; diamètre : 5 millimètres. Sceaux.

(68) *Mitra similata*, Millet. Coq. petite, fusiforme, composée de 7-8 tours de spire, couverts de petites côtes verticales, croisées par des stries transversales très-rapprochées. Ouverture étroite, faisant un peu plus du tiers de la longueur totale de la coq. Bord droit strié intérieurement. 2 ou 3 plis à la columelle se prolongent en dehors jusqu'au bord droit. Longueur : 10-11 millimètres ; diamètre : 5 millimètres. Sceaux. Cette espèce a quelques rapports avec *M. plicatula*, Sismonda.

(69) *Cancellaria Beraudiana*, Millet. Coq. assez grande, en ovale ventru et pointu au sommet, composée de 7 tours de spire arrondis, marqués de côtes verticales, croisées par de grosses stries, qui en passant sur chaque côte, y laissent une espèce de carène fortement prononcée. Le dernier tour, en outre, amplement dilaté, porte un bourrelet extérieur, sur lequel viennent aboutir les stries en question ; l'ouverture, fortement élargie sur le bord droit, porte sur cette partie un rang de denticules qui en garnit toute l'étendue ; le bord gauche renforcé vers sa partie moyenne présente sur la columelle trois plis élevés, et en dehors de celle-ci une fente ombilicale seulement. Longueur : 25-27 millimètres ; diamètre : 18-20 millimètres. Sceaux. Rare. Cette espèce a quelques rapports avec le *C. evulsa*, Sow.

(70) *Cancellaria aspera*, Millet. Coq. de moyenne taille, en ovale pointu et perforé à sa base, est composée de 7 tours de spire. Chaque tour, muni de côtes verticales angulaires et recouvrantes, et coupé transversalement par des filets plus rapprochés que ne le sont les côtes, présente à son sommet une rampe scalariforme, angulaire, dont les marches sont indiquées par le prolongement des côtes et qui forme sur son bord externe une crête à dents aiguës. Ouverture ovale, biangulaire, avec trois plis obliques sur la columelle. Longueur : 18-20 millimètres ; diamètre : 10-11 millimètres. Th., Sc., Saint-Clément. Ren. — Ne pas confondre cette espèce avec l'*acutangula*, Fauj. qui ne lui ressemble qu'imparfaitement.

(71) *Cancellaria auriculoïdes*, Millet. Coq. petite, ovale, très-allongée, composée de 7 tours de spire, peu bombés et portant de grosses côtes verticales ou obliques, mais souvent nulles sur le dernier tour, tous sont très-finement striés transversalement. Ouverture semi-lunaire, munie de deux petits plis columellaires. Longueur : 13-14 millimètres ; diamètre : 11 millimètres. Th., Sc.

Elle présente des individus de taille inférieure, sans côtes et qui ne constituent qu'une simple variété.

#### FAMILLE DES CONIDES.

(72) *Conus torulosus*, Millet. Coq. de moyenne taille, à spire élevée, conique, composée de 11-12 tours creusés en gouttière et bordés chacun d'un cordonnet ar-