

T R A V E L S

THROUGH

VARIOUS PROVINCES

OF

The Kingdom of Naples,

IN 1789.

BY CHARLES ULYSSES,

OF

SALIS MARSCHLINS.

TRANSLATED FROM THE GERMAN,

BY ANTHONY AUFRERE, Esq.

ILLUSTRATED WITH ENGRAVINGS.

L O N D O N :

PRINTED FOR T. CADELL, JUN. AND W. DAVIES,
(Successors to Mr. Cadell), in the Strand.

M.DCC.LXV.

the sea is quite still, at the sultry noontide, and catches little fish and insects in its filaments, which it spreads out like a net. As soon as it makes any booty, or that the surface of the sea begins to be ruffled, but more especially when it discovers an enemy, it draws in its sail, oars, and net, lets some water into its vessel, and instantly descends. Almost all these observations were confirmed to me at Naples, Taranto, and in Sicily.

CONUS.

16. *Virgo*. Linn. 294. Mart. t. ii. tab. 53. fig. 585—586. Taranto affords the perfectly white, the yellowish, and those with a blue apex.

17. *Jaspis*. Mart. t. ii. tab. 55. fig. 612. Testa basi rotundata tota lutea fascia alba: anfractibus albis. Although Martini says the small yellowish cones with a white fascia, which he received from the Spanish sea, were only damaged specimens, resembling his *conus jaspis*, I shall conclude the above under that distinction. I cannot however comprehend how

this and the two following cones, so frequent in the Mediterranean, should have escaped the notice of so many conchologists.

18. *Olivaceus*. Mart. t. ii. tab. 55. fig. 613. Testa lævi elongata, tota olivacea albo maculata et fasciata; spira acuminata, prima maculis fuscis cincta, apertura violacea, margine fasciæque alba. Taranto. This cone would be very like Martini's figure, if it were adorned with celestial blue clouds.

19. *Humilis*. Testa gibba, tota fusca, fasciæ alba, anfrachibusque albis, basi rotundata cylindro duplo, longiore quam spira. Taranto and Naples. My books say nothing of this cone, which is two inches in length. When polished it is very glossy, and clouded rather grey. The orifice, with a white border, is either brown or blue.

20. *Monachus*. Linn. 304. Mart. t. ii. tab. 55. fig. 612. d. Taranto.

CYPRÆA.

21. *Lurida*. Linn. 335. Mart. t. i. tab. 30. fig.

Reisen
in
verschiedne Provinzen
des
Königreichs Neapel.

Von
Carl Wlffes von Salis-Marschlins.

Erster Band.

Mit Kupfern.

Zürich und Leipzig,
bey Ziegler und Söhne.

1 7 9 3.

Man hat mir fast alle diese Beobachtungen in Neapel, zu Tarent und in Sizilien bestätigt.

C O N U S.

16. *Virgo*. Linn. 294. Mart. T. 2. Tab. 53. fig. 585, und 586. Man findet in Tarent sowohl die ganz weissen, als die gelblichten, und diejenigen mit einer blauen Spitze.
17. *Jaspis*. An Mart. T. 2. Tab. 55. Fig. 612? Testa basi rotundata tota lutea fascia alba: Anfractibus albis. Von Tarent und Neapel. Da Martini sagt, er habe aus der spanischen See viele kleine Regel erhalten, welche zwar gelblicht und mit einer weissen Binden umwunden, aber nur abgeriebene Exemplare seines *Conus Jaspis* wären, so will ich indessen obbeschriebene Schnecke auch dazu rechnen. Uebrigens begreife ich nicht, wie dieser und die zwey folgenden Regel, die doch im mittelländischen Meere so häufig sind, so vielen Conchyliologen unbekannt bleiben konnten.
18. *Olivaceus*. An Mart. T. 2. Tab. 55. fig. 613? testa lævi elongata, tota olivacea albo maculata & fasciata. Spira acuminata, prima maculis fuscis cincta, Apertura violacea, margine fasciaque alba. Dieser Regel würde der angeführten Figur sehr ähnlich seyn, wenn er auch mit Himmelblauen Wolken geziert wäre. Von Tarent.

19. *Humilis*. Testa gibba, tota fusca, fascia alba, anfractibusque albis, Basi rotundata cylindro duplo, longiore quam Spira. Von Tarent und Neapel. Von diesem Kegel, der doch eine Länge von 2 Zoll erreicht, finde ich in meinen Büchern nichts. Geschliffen, wird er sehr glänzend und etwas grau gewölkt. Die mit einem weissen Rande versehene Mündung ist zuerst braun, dann blau.
20. *Monachus*. Linn. 304. Mart. T. 2. Tab. 55. fig. 612. d. Von Tarent.

Cypraca.

21. *Lurida*. Linn. 335. Mart. T. 1. Tab. 30. fig. 315. Ueberall häufig mit und ohne Bänder, bis 2 Zoll lang.
22. *Siciliana*. Mart. T. 1. Tab. 27. fig. 267 und 268. Testa subturbinata (ut *Lurida*) laevi subflava fasciis pallidioribus albo guttata subtus crocea, fauce Amethystea. Es giebt verschiedene Abänderungen, die alle einen prächtigen Glanz haben.
23. *Pediulus*. Linn. 364. Mart. T. 1. Tab. 29. fig. 309. von Tarent.

Bulla.

24. *Spelta*. Linn. 372. Mart. T. 1. Tab. 27. fig. 215 und 216. Von Tarent. Meine Exemplare des unächten Weberspuls haben eine salbe Farbe mit weissem Saum und Lippen.