



JOURNAL
DE
CONCHYLIOLOGIE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION

DE MM. CROSSE ET FISCHER.

3^e série. — Tome XVII^e.

VOLUME XXV



A PARIS.
CHEZ H. CROSSE, RUE TRONCHET, 25.

—
1877

Descriptions d'espèces nouvelles de l'**Archipel
Calédonien,**

PAR LE D^r SOUVERBIE.

(24^e article.)

1. **CONUS LAMBERTI**, Souverbie (pl. I, fig. 1).

Testa elongata, cylindraceo-conica, inferne subconstricta, longitudinaliter tenuissima striata, basin versus obliqua subimpresso-striata; spira depresso-conica, canaliculata, medio in conum obtusum, apice acutum subelata; anfr. 12, primis (5-6) superne tuberculis coronatis, cæteris ad angulum rotundatis, latere suturali sat late depressis, depressione medio unistriata. Testa, sub epidermide tenuissima et colores testæ vix attenuante, aurantiaca, albo-maculata; maculis triangularibus, inæqualibus, sæpe grandibus et altioribus quam latioribus, versus labrum plerumque plus minusve marginatis, in tres series fasciatim distributis, latas, subæquales, primam superam, secundam medianam, tertiam basalem. — Long. 107, lat. max. 53 mill. (Mus. Burdigalense). Spec. unicum vidi.

Hab. Ins. Ouvea (Loyalty), archip. Caledon. (R. P. Lambert); specimen 1 vidi.

Coquille assez solide, allongée, en cône cylindracé et un peu contracté inférieurement, finement sillonnée en long par les stries d'accroissement du test, avec des stries subimprimées, embrassant obliquement sa base; spire subdéprimée, cannelée, élevée au milieu en cône obtus, pointu au sommet; tours au nombre de 12, les 5-6 premiers tuberculeusement couronnés, les autres arrondis à leur partie anguleuse, assez largement déprimés, du côté de la suture, sous forme d'un canal peu profond et unistrié au milieu. — Sous un épiderme très-mince et qui atténue à peine ses teintes, cette coquille, de couleur orangée foncée, est maculée de taches blanches, triangulaires, inégales, la plupart plus hautes que larges, généralement plus ou moins bordées en dehors, à leur côté qui se dirige vers le labre, d'une teinte subombrée, et groupées en trois bandes transverses : ces bandes, plus larges que leurs intervalles, sont subégales et placées aux parties supérieure, médiane et terminale de la coquille, la supérieure s'étendant jusqu'à la suture en dessus de la spire, qui se trouve ainsi maculée de blanc aussi (Musée de Bordeaux).

Hab. Vu ce seul exemplaire, provenant de l'Île Ouvea (Loyalty). Nous l'avons reçu du R. P. Lambert, auquel nous nous faisons un vrai plaisir de le dédier.

2. *AMATHINA ANGUSTATA*, Souverbie (pl. 1, f. 6).

Amathina angustata, Souverbie, Journ. de Conchyl. Vol. XXIII, p. 45.

Coquille capuliforme, allongée, subtrigone-ovale, un



1



Arnoul del.

Imp. Becquet, Paris.

1. *Conus Lamberti*, Souverbie.

2. *Mitra turturina*, Souverbie.

3. *Rissoina scolopax*, Souverbie.

4. *Rissoina hystrix*, Souverbie.

5. *Scalenostoma apiculatum*, Souverbie.

6. *Amathina angustata*, Souverbie.



I



I



I



I



Arnoul del.

Imp. Becquet, Paris.

Leurotoma (Defrancia) concinna, Scacchi.
_____ (D. _____) linearis, Montagu.
Marginella cœlata, Monterosato.

4. Ringicula conformis, Monterosato.
5. Scalaria candidissima, Monterosato.
6. Trochus (Gibbula) Drepanensis, Brugnone.

7. Conus Lamberti, Souverbie.